



INSECTICIDA

Brontes 2,5

Concentrado emulsionable (EC)

INSECTICIDA QUE ACTÚA POR CONTACTO E INGESTIÓN

COMPOSICIÓN: Deltametrina 2,5 % p/v (25 g/l)

INSCRITO EN EL REGISTRO O. DE P. Y M. F., CON EL N°: ES-00484

CLASIFIC. TOXICOLÓGICA: ver etiqueta

USO RESERVADO A AGRICULTORES Y APLICADORES PROFESIONALES
A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE,
SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO

CARACTERÍSTICAS:

BRONTES 25 es un insecticida de uso profesional en cultivos al aire libre e invernadero. Actúa por contacto e ingestión contra un amplio espectro de plagas. Dotado de una rápida acción inicial, consigue una suficiente protección vegetal con gran seguridad de uso.

USOS Y DOSIS AUTORIZADAS:

Cultivo*	Plaga / enfermedad	Dosis (L/ha)	Nº aplicac.	Vol. Caldo (L)
Calabacín (A) (I) *	Pulgones: <i>Aphis gossypii</i> , <i>Myzus persicae</i> Noctuidos: <i>Autographa gamma</i> , <i>Helicoverpa armigera</i> , <i>Spodoptera littoralis</i>	0,5	2 (14 días)	300-1000
Pepino Pepinillo (A) (I) *	Pulgones: <i>Aphis gossypii</i> , <i>Hyperomyzus lactucae</i> Noctuidos: <i>Agrotis ipsilon</i> , <i>Agrotis segetum</i> , <i>Helicoverpa armigera</i> , <i>Spodoptera sp.</i>	0,5	2 (14 días)	300-1000
Melón (A) *	Pulgones: <i>Aphis gossypii</i> , <i>Myzus persicae</i> Noctuidos: <i>Autographa gamma</i> , <i>Helicoverpa armigera</i> , <i>Spodoptera littoralis</i> , <i>Spodoptera exigua</i> , <i>Agrotis ipsilon</i> , <i>Agrotis segetum</i>	0,5	2 (14 días)	300-1000
Sandía (A) *	Pulgones: <i>Aphis gossypii</i> , <i>Macrosiphum euphorbiae</i> Noctuidos: <i>Autographa gamma</i> , <i>Helicoverpa armigera</i> , <i>Spodoptera littoralis</i> , <i>Spodoptera exigua</i>	0,5	2 (14 días)	300-1000
Fresal (A) *	Pulgones: <i>Aphis gossypii</i> , <i>Aphis ruborum</i> , <i>Aulacorthum solani</i> , <i>Chaetosiphon fragaefolii</i> , <i>Myzus persicae</i> Noctuidos: <i>Agrotis ipsilon</i>	0,5	2 (14 días)	300-1000
Coliflor Col Brócoli (A) *	Pulgones: <i>Brevicoryne brassicae</i> , <i>Lipaphis erysimi</i> , <i>Myzus persicae</i> Noctuidos: <i>Agrotis ipsilon</i> , <i>Agrotis segetum</i> , <i>Helicoverpa armigera</i> , <i>Mamestra brassicae</i> , <i>Spodoptera littoralis</i> , <i>Plutella xylostella</i> Larvas de lepidopteros: <i>Pieris brassicae</i> , <i>Pieris rapae</i>	0,5	2 (14 días)	300-1000





INSECTICIDA

Brontes 2,5

Olivo (A) *	Lepidopteros: <i>Prays oleae</i>	0,4	1 (-)	800-1000
Tomate Berenjena (A) (I) *	Pulgones: <i>Aphis gossypii</i> , <i>Macrosiphum euphorbiae</i> , <i>Myzus persicae</i> Noctuidos: <i>Helicoverpa armigera</i> , <i>Chrysodeixis chalcites</i> , <i>Agrotis segetum</i> , <i>Autographa gamma</i> , <i>Spodoptera exigua</i> , <i>Spodoptera littoralis</i>	0,5	2 (14 días)	300-1000

* (A): aire libre; (I): Invernadero.

MODO DE EMPLEO:

- Efectuar un máximo de 2 aplicaciones por campaña con un intervalo de tiempo de 14 días entre aplicación.
- Diluir la dosis recomendada de BRONTES 25 en un poco de agua, verter en el tanque y ajustar el volumen al autorizado en cada cultivo, mientras se mantiene la agitación.
- Aplicar en pulverización normal al aire libre mediante mochila hidráulica, tractor atomizador en cultivos altos y tractor hidráulico en cultivos bajos y mediante lanza o pistola de pulverización en invernadero (solo flor cortada, plantas ornamentales y viveros).
- BRONTES 25 actúa por contacto e ingestión, por lo que es necesario realizar un tratamiento muy preciso teniendo en cuenta que la pulverización sea lo más uniforme posible sobre toda la vegetación.
- Para asegurar la mejor eficacia del tratamiento, pulverizar de manera preventiva antes de que el parásito penetre en la planta o cause el rizado de las hojas.

OBSERVACIONES:

- Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en un lugar fresco. Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
- El preparado no se usará en combinación con otros productos.

PLAZO DE SEGURIDAD:

- Olivo: No procede fijarlo
- Cucurbitáceas de piel comestible, Cucurbitáceas de piel no comestible, Fresal, Solanáceas: 3 días
- Hortalizas de género Brassica: 7 días

PARA TODA INFORMACIÓN, SOBRE EL USO DE ESTE PRODUCTO Y EN ESPECIAL TODO LO RELATIVO A RIESGOS Y SEGURIDAD, LÉASE DETENIDAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO O PÓNGASE EN CONTACTO CON EL SUMINISTRADOR.

