



# FUNGICIDA

**Nefele CF**

Suspensión Concentrada (SC)

FUNGICIDA SISTÉMICO, TRANSLAMINAR, CON ACCIÓN PROTECTORA, CURATIVA Y ERRADICANTE, PARA EL CONTROL DE NUMEROSAS ENFERMEDADES

COMPOSICIÓN: Azosistrobin 25% p/v (250 g/l)

INSCRITO EN EL REGISTRO O. DE P. Y M. F., CON EL N°: ES-00318 (DEN. COMÚN NEFELE CF)

CLASIFIC. TOXICOLÓGICA: ver etiqueta

USO RESERVADO A AGRICULTORES Y APLICADORES PROFESIONALES  
A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE,  
SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO

## CARACTERÍSTICAS:

**NEFELE CF** es un fungicida sistémico, translaminar, con acción protectora, curativa y erradicante, que controla numerosas enfermedades fúngicas. Perteneciente al grupo químico de las estrobirulinas y, mediante la inhibición de la respiración mitocondrial, inhibe la producción y germinación de las esporas y el crecimiento del micelio.

## APLICACIONES AUTORIZADAS:

Cultivo	Plaga/Efecto	Momento de aplicación	N° máximo aplicaciones	Intervalo mínimo entre aplicaciones (días)	Dosis máxima (L producto/ha)	Volumen máximo de agua(l/ha)	Plazo de seguridad (días)
Alcachofa	Mildiu y Oidio	BBCH 10-49	2	7-10	0.8-1	800-1000	7
Espárrago	Roya y Stemfilium	BBCH 10-93	2	10-14	0.8-1	600-800	N/A
Berenjena	Mildiu, Alternaria, Cladosporium	BBCH 10-85	2	7-10	0.64 (inver) 0.8 (a.libre)	800	3
	Oidio				0.64 (inver) 0.7 (a.libre)		
Cebada	Rincosporium, Roya, Septoria, Helminthosporium y Oidio	BBCH 32-69	2	10-14	0.8-1	200-400	35
Judías	Botritis y Roya	BBCH 10-69	2	10-14	0.8-1	600-800	14
Coles de Bruselas	Alternaria y Micosphaerella	BBCH 10-49	2	10-14	0.8-1	600-800	14





# FUNGICIDA

**Nefele CF**

Cultivo	Plaga/Efecto	Momento de aplicación	Nº máximo aplicaciones	Intervalo mínimo entre aplicaciones (días)	Dosis máxima (L producto/ha)	Volumen máximo de agua(l/ha)	Plazo de seguridad (días)
Zanahoria	Alternaria y Oidio	BBCH 10-49	2	10-14	0.8-1	300-600	7
Pepino	Mildiu, Didimella y Oidio	BBCH 10-85	2	5-7	0.64 (inver) 0.8 (a.libre)	800	3
	Oidio				0.64 (inver) 0.7 (a.libre)		
Ajo	Mildiu,	BBCH13-49	2	7-10	0.8-1	300-600	7
	Alternaria y Roya			10-14			
Pepinillo	Mildiu, Didimella y Oidio	BBCH 10-85	2	5-7	0.64 (inver) 0.8 (a.libre)	800	3
	Oidio				0.64 (inver) 0.7 (a.libre)		
Judías verdes	Botritis y Roya	BBCH 10-69	2	10-14	0.8-1	600-800	7
Puerro	Mildiu, Alternaria y Roya	BBCH 13-49	2	10-14	0.8-1	300-600	15
Melón	Mildiu, Didimella y Oidio	BBCH 10-85	2	5-7	0.64 (inver) 0.8 (a.libre)	800	3
	Oidio				0.64 (inver) 0.7 (a.libre)		
Cebolla	Botritis, Mildiu, Alternaria y Roya	BBCH 13-49	2	10-14	0.8-1	300-600	7
Guisantes	Antracnosis, Botritis, Didimella, Oidio y Roya	BBCH 10-69	2	10-14	0.8-1	600-800	14
Pimiento	Mildiu, Alternaria, Cladosporiosis	BBCH 10-85	2	7-10	0.64 (inver) 0.8 (a.libre)	800	3
	Oidio				0.64 (inver) 0.7 (a.libre)		
Guisante proteaginoso	Antracnosis, Botritis, Oidio y Roya Didimella	BBCH 10-69	2	10-14	0.8-1	600-800	14





# FUNGICIDA

**Nefele CF**  
®

Cultivo	Plaga/Efecto	Momento de aplicación	Nº máximo aplicaciones	Intervalo mínimo entre aplicaciones (días)	Dosis máxima (L producto/ha)	Volumen máximo de agua(l/ha)	Plazo de seguridad (días)
Calabaza	Mildiu, Didimella	BBCH 10-85	2	5-7	0.64 (inver) 0.8 (a.libre)	800	3
	Oidio				0.64 (inver) 0.7 (a.libre)		
Arroz	Piricularia y Helminthosporium	BBCH 41-59	2	10-14	1	200-400	28
Chalote	Mildiu, Alternaria y Roya	BBCH 13-49	2	10-14	0.8-1	300-600	7
Fresales	Oidio	BBCH 10-85	2	7-10	0.8-1	600-800	3
Tomate	Mildiu, Alternaria, Cladosporium	BBCH 10-85	2	7-10	0.64 (inver) 0.8 (a.libre)	800	3
	Oidio				0.64 (inver) 0.7 (a.libre)		
Triticale	Septoria y Oidio	BBCH 32-69	2	10-14	0.8-1	200-400	35
Sandía	Mildiu, Didimella	BBCH 10-85	2	5-7	0.64 (inver) 0.8 (a.libre)	800	3
	Oidio				0.64 (inver) 0.7 (a.libre)		
Trigo	Roya, Rincosporium, Septoria, Oidio y Helminthosporium	BBCH 32-69	2	10-14	0.8-1	200-400	35
Calabacín	Mildiu y Didimella	BBCH 10-85	2	5-7	0.64 (inver) 0.8 (a.libre)	800	3

## **MODO DE EMPLEO:**

Aplicar en pulverización foliar normal, con tractor o manual.

En berenjena, pepino, pepinillo, melón, pimiento, calabaza, tomate, sandía y calabacín, tanto en aire libre como en invernadero.





# FUNGICIDA

**Nefele<sup>®</sup>CF**

## **PRECAUCIONES:**

Para evitar la aparición de resistencias se recomienda no utilizar fungicidas con el mismo modo de acción durante la misma campaña.

**PARA TODA INFORMACIÓN, SOBRE EL USO DE ESTE PRODUCTO  
Y EN ESPECIAL TODO LO RELATIVO A RIESGOS Y SEGURIDAD,  
LÉASE DETENIDAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
O PÓNGASE EN CONTACTO CON EL SUMINISTRADOR.**

