



HERBICIDA

Partenope 800[®]

Concentrado emulsionable (EC)

HERBICIDA PARA CEBADA Y TRIGO DE INVIERNO

COMPOSICIÓN: Prosulfocarb 80 % p/v (800 g/l)
INSCRITO EN EL REGISTRO O. DE P. Y M. F., CON EL N°: ES-00293
CLASIFIC. TOXICOLÓGICA: ver etiqueta
USO RESERVADO A AGRICULTORES Y APLICADORES PROFESIONALES
A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE,
SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO

MODO DE ACCIÓN:

- Herbicida de aplicación pre o post emergencia temprana, es absorbido por la raíces, hojas y semillas cuando éstas germinan y se trasloca a las zonas meristemáticas.
- Actúa inhibiendo la síntesis de los lípidos provocando la alteración de la membrana celular. La sintomatología que produce se caracteriza por la aparición de un color verde oscuro, enrollamiento, inhibición de brotes y raíz y fallo de la emergencia de la hoja desde el coleóptilo.

APLICACIONES AUTORIZADAS:

- Control de malas hierbas anuales en pre- y post-emergencia temprana en cebada y trigo de invierno.
- Aplicar desde después de la siembra, en pre-emergencia de las malas hierbas o cuando estas tienen menos de dos hojas y cuando el cultivo tiene un máximo de dos hojas (BBCH 12).

DOSIS Y MODO DE EMPLEO:

- Aplicar en pulverización normal con un gasto de caldo entre 200-400 L/ha. Se aconseja el uso de boquillas de abanico 110° con una presión de pulverización baja (2-3 kg/cm²).
- La dosis recomendada de aplicación es de 4 a 5 L/ha con una sola aplicación. Para el uso en postemergencia temprana la dosis queda limitada a 4 L/ha.

RECOMENDACIONES:

- En ningún caso se aplicará en cultivos de cereales cuya siembra haya sido efectuada en malas condiciones, sobre todo si la semilla ha quedado muy superficial (profundidad óptima 20-30 mm.).





HERBICIDA

Partenope 800[®]

- El preparado es eficaz en el control de gramíneas anuales: (*Apera spica-venti*, *Poa annua*, *Poa trivialis*, *Alopecurus myosuroides*, *Lolium sp* (Vallico) y dicotiledóneas anuales (*Galium aparine*, *Anthemis arvensis* (Manzanilla salvaje), *Stellaria media*, *Lamium purpureum*, *Fumaria officinalis*, *Solanum nigrum*, *Atriplex patula*, *Chenopodium album*, *Thlaspi arvense*, *Veronica spp.*, *Capsella bursa-pastoris*, *Myosotis arvensis*, *Anthemis spp.*, *Viola arvensis*, etc.).
- Para mejorar la eficacia contra Galium, Veronica o en presencia de una infestación variada de malas hierbas, PARTENOPE 800 se podrá mezclar con otros herbicidas autorizados en cereal.

RESTRICCIONES:

En caso de pérdida de la cosecha de un cultivo primario tratado con Prosulfocarb, se recomienda sembrar/plantar solo patatas, trigo o cebada.

PLAZO DE SEGURIDAD:

No procede por la época de aplicación del producto.

PARA TODA INFORMACIÓN, SOBRE EL USO DE ESTE PRODUCTO Y EN ESPECIAL TODO LO RELATIVO A RIESGOS Y SEGURIDAD, LÉASE DETENIDAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO O PÓNGASE EN CONTACTO CON EL SUMINISTRADOR.

