



HERBICIDA

Tindareo

Granulado dispersable en agua (WG)

HERBICIDA RESIDUAL Y DE CONTACTO

COMPOSICIÓN: Flazasulfuron 25% p/p (250 g/kg)

INSCRITO EN EL REGISTRO O. DE P. Y M. F., CON EL N°: ES-00408

(DENOMINACIÓN COMÚN: TINDAREO)

CLASIFIC. TOXICOLÓGICA: ver etiqueta

USO RESERVADO A AGRICULTORES Y APLICADORES PROFESIONALES
A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE,
SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO

CARACTERÍSTICAS:

TINDAREO es un herbicida residual y de contacto para el control de un amplio rango de malas hierbas tanto gramíneas (anuales y perennes) como dicotiledóneas y ciperáceas en cítricos, olivo, viña y áreas no cultivadas.

TINDAREO es rápidamente absorbido por las raíces y las hojas, siendo traslocado vía floema y xilema.

Clarificación del modo de acción de la sustancia activa según HRAC:

GRUPO **2** **HERBICIDA**

USOS, DOSIS Y MODO DE EMPLEO:

Cultivo	Plaga	Dosis g/ha	Momento de aplicación	N.º de aplicaciones	PS (días)
Áreas no cultivadas (agrícolas y forestales) (*)	Malas hierbas (gramíneas y dicotiledóneas y Cyperus spp)	60-200	N.A.	1	N.A.
Áreas no cultivadas (no agrícolas ni forestales) (**)					N.A.
Vid			Invierno y Primavera		N.A.
Cítricos			Primavera		N.A.
Olivo			Otoño		45
		60-100	Primavera		N.A.
		60-200			





HERBICIDA

Tindareo

(*) Áreas no cultivadas (agrícolas y forestales): Se incluyen márgenes de cultivos, linderos, caminos, cortafuegos y eriales

(**) Áreas no cultivadas (no agrícolas ni forestales): Excepto vías férreas. Se incluyen carreteras, bordes de arcén y cunetas, medianas, áreas de descanso, redes de servicio, tendidos eléctricos, conducciones hidráulicas

Utilice un volumen de aplicación de 250-400 L/ha para aplicaciones con tractor y de 600 L/ha para aplicaciones manuales:

- Aplicación mecánica y manual por pulverización al suelo en bandas.
- En cítricos, olivo y vid localizar el producto debajo de las filas, tratando como máximo 1/3 de la superficie a tratar, equivalente a 66.6 g de producto por hectárea (0,017 kg s.a./ha).
- Eficaz contra malas hierbas de monocotiledóneas, malas hierbas de hoja ancha y ciperáceas.
- Aplicar antes de que las malas hierbas tengan 4 hojas.

Preparación de la mezcla:

Añadir la mitad del agua necesaria al tanque del pulverizador. Añadir la cantidad de producto recomendada y completar el volumen de agua necesario. Mantener continuamente la agitación en el tanque durante la preparación de la mezcla y la aplicación. No preparar más solución de pulverización que la necesaria.

MALAS HIERBAS SUSCEPTIBLES:

Amaranthus blitoides, Amaranthus retroflexus, Calendula arvensis, Chamaemelum fuscum, Chamaemelum mixtum, Chenopodium album, Conyza spp., Diplotaxis erucoides, Echinochloa crus-galli, Erodium spp., Geranium dissectum, Hordeum murinum, Lolium multiflorum, Lolium spp., Malva spp., Medicago polymorpha, Polygonum spp., Poa annua, Portulaca oleracea, Raphanus raphanistrum, Senecio vulgaris, Setaria spp., Stellaria media, Urtica spp., Cyperus rotundus.

Si el producto se aplica solo, debe añadirse un surfactante para mejorar su acción de postemergencia. Las aplicaciones en post-emergencia se deben hacer hasta un máximo de 4 hojas en las malas hierbas.





HERBICIDA

Tindareo

PRECAUCIONES BIOLÓGICAS:

Las dosis más altas tendrán efecto durante periodos de tiempo más largos.

Para evitar o retrasar la posible aparición de resistencias, es importante alternar o mezclar el uso de flazasulfuron con herbicidas de otras familias químicas.

Las recomendaciones habituales para el manejo de resistencias son: monitoreo regular del campo, seguir las indicaciones de la etiqueta del producto (no aplicar a una dosis mayor o menor que la dosis recomendada o demasiado temprano o demasiado tarde), integrar métodos químicos con otros métodos culturales. Siempre que sea posible, se deberán usar varias estrategias conjuntamente.

Al ser un herbicida sistémico, su efecto podría ser menor en condiciones secas y con bajas temperaturas, ya que en estas condiciones el metabolismo de las malas hierbas es menor.

La lluvia o riegos dentro de las dos horas posteriores al tratamiento podrían reducir la eficacia sobre las malas hierbas presentes.

No pulverizar bajo condiciones de fuerte viento, evitando especialmente la deriva hacia cultivos anuales.

No pulverizar directamente sobre el follaje de los cultivos.

No aplicar en plantaciones menores de 4 años.

**PARA TODA INFORMACIÓN, SOBRE EL USO DE ESTE PRODUCTO
Y EN ESPECIAL TODO LO RELATIVO A RIESGOS Y SEGURIDAD,
LÉASE DETENIDAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
O PÓNGASE EN CONTACTO CON EL SUMINISTRADOR.**

