



# FUNGICIDA

**Nayades 380**

Suspensión Concentrada (SC)

FUNGICIDA Y BACTERICIDA

COMPOSICIÓN: Oxicloruro de Cobre (expresado en cobre): 38% p/v (380 g/l)  
INSCRITO EN EL REGISTRO OFICIAL DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS CON EL N°: ES-00941  
CLASIFIC. TOXICOLÓGICA: ver etiqueta  
USO RESERVADO A AGRICULTORES Y APLICADORES PROFESIONALES  
(TAMBIÉN AUTORIZADO PARA USO NO-PROFESIONAL)  
CERTIFICADO PARA AGRICULTURA ECOLÓGICA  
A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE,  
SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO

## **CARACTERÍSTICAS:**

NAYADES 380 es un fungicida/bactericida a base de cobre (en forma de oxicloruro) que inhibe el desarrollo y crecimiento de enfermedades causadas por patógenos fúngicos y bacterianos. Se caracteriza por su acción protectora por contacto.

## **APLICACIONES AUTORIZADAS EN USO PROFESIONAL:**

Cultivo	Enfermedad	N° aplic. (Intervalo)	Momento de aplicación	Dosis	Volumen de caldo (L/ha)	Plazo de Seguridad (días)
<b>Cerezo</b> (incluye guindo)	Moteado, Bacteriosis, Cribado, Monilia	1 (-)	BBCH 33-53	0,3 %	1000 L/ha	-
<b>Ciruelo</b> (incluye ciruela japonesa y los híbridos asociados al ciruelo y ciruelo japonés)	Moteado, Bacteriosis, Cribado, Monilia	1 (-)	BBCH 33-53	0,3 %	1000 L/ha	-
<b>Manzano</b>	Bacteriosis, Moteado	1 (-)	BBCH 33-53	0,3 %	1000 L/ha	-
<b>Melocotonero</b> (incluye nectarino, paraguayo y otros híbridos asociados al melocotonero)	Moteado, Bacteriosis, Cribado, Monilia	1 (-)	BBCH 33-53	0,3 %	1000 L/ha	-





# FUNGICIDA

## Nayades 380

Cultivo	Enfermedad	Nº aplic. (Intervalo)	Momento de aplicación	Dosis	Volumen de caldo (L/ha)	Plazo de Seguridad (días)
Olivo	Repilo, Tuberculosis	1 (-)	BBCH 00-09 y/o BBCH 11-69 o BBCH 80-85	0,3 %	920-1000 L/ha	14
	Repilo, Tuberculosis	2 (20 días)	BBCH 00-09 y/o BBCH 11-69 o BBCH 80-85	0,276 %	920-1000 L/ha	14
Peral (incluye nashi y pera blanca china)	Moteado del peral, Bacteriosis	1 (-)	BBCH 33-53	0,3 %	1000 L/ha	-
Tomate (aire libre)	Mildiu, Bacteriosis	4 (7-14 días)	BBCH 15-89	0,2-	1000 L/ha	10
Tomate (invernadero)				0,3 %	700-1000 L/ha	
Vid	Mildiu, Bacteriosis	3 (7-14 días)	BBCH 15-81	0,3 %	1000 L/ha	21

### CONDICIONES GENERALES DE USO:

Aplicar en cultivos al aire libre mediante pulverización normal con tractor y manual con lanza o pistola y manual con mochila. En invernadero aplicar mediante pulverización manual con lanza o pistola y manual con mochila.

En tomate, no superar la dosis de aplicación anual de 10,5 L/ha.

Se deben revisar periódicamente las estrategias de gestión de la resistencia, se debe informar de los programas de monitoreo de la sensibilidad y se recomienda estar atentos a los cambios en el rendimiento.

**PARA TODA INFORMACIÓN, SOBRE EL USO DE ESTE PRODUCTO Y EN ESPECIAL TODO LO RELATIVO A RIESGOS Y SEGURIDAD, LÉASE DETENIDAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO O PÓNGASE EN CONTACTO CON EL SUMINISTRADOR.**

