



FUNGICIDA

Nayades 70

Suspensión Concentrada (SC)

FUNGICIDA Y BACTERICIDA

COMPOSICIÓN: Oxiclورو de Cobre (expresado en cobre): 70% p/v (700 g/l)
INSCRITO EN EL REGISTRO O. DE P. Y M. F., CON EL N°: ES-00985 (DEN. COM. NAYADES 70)

CLASIFIC. TOXICOLÓGICA: ver etiqueta

USO RESERVADO A AGRICULTORES Y APLICADORES PROFESIONALES
AUTORIZADO PARA USO PROFESIONAL Y NO PROFESIONAL
CERTIFICADO PARA AGRICULTURA ECOLÓGICA
A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE,
SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO
REQUISITO INDISPENSABLE: AGITAR EL PRODUCTO ANTES DE USAR

CARACTERÍSTICAS:

NAYADES 70 es una suspensión concentrada de cobre de acción fungicida y bactericida para uso profesional y no profesional, en usos al aire libre e invernadero.

USOS Y DOSIS AUTORIZADOS:

Ambito de Aplicación Agrario

Uso Profesional: al aire libre.

Aplicación en pulverización normal con tractor, manual con lanza, pistola o mochila:

USO	AGENTE	Dosis l/ha	Nº Aplic.	Intervalos	Vol. Caldo	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN
Olivo	REPILO	1,5	1-2	23 días	1000 l/ha	Eficaz contra <i>Cyloconium oleaginum</i> . Aplicar en BBCH 00-04, BBCH 11-69 y BBCH 80-85.
	TUBERCULOSIS					Eficaz contra <i>Pseudomonas savastanoi pv savastanoi</i> . Aplicar en BBCH 00-04, BBCH 11-69 y BBCH 80-85.
Tomate	MILDIU	1,05	1-4	7-14 días	700 l/ha	Eficaz contra <i>Phytophthora infestans</i> . Aplicar entre BBCH 15-89.
Vid	MILDIU	1,5	1-3	7-14 días	1000 l/ha	Eficaz contra <i>Plasmopara viticola</i> . Aplicar entre BBCH 15-81.
	BACTERIOSIS					





FUNGICIDA

Nayades 70

Uso Profesional: invernadero.

Aplicación manual con lanza, pistola o mochila:

USO	AGENTE	Dosis l/ha	Nº Aplic.	Intervalos	Vol. Caldo	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN
Tomate	MILDIU	1,05	1-4	7-14 días	700 l/ha	Eficaz contra Phytophthora infestans. Aplicar entre BBCH 15 hasta Desarrollo vegetativo inferior a 1 m.

Ambito de Aplicación No Agrario

Uso no Profesional:

Pulverización manual con mochila:

USO	AGENTE	Dosis l/ha	Nº Aplic.	Intervalos	Vol. Caldo	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN
Olivo	REPILO	1,5	1-2	23 días	1000 l/ha	Eficaz contra <i>Cyloconium oleaginum</i> . Aplicar con mochila pulverizadora de 5 l. Aplicar en BBCH 00-04, BBCH 11-69 y BBCH 80-85.
	TUBERCULOSIS					Eficaz contra <i>Pseudomonas savastanoi</i> vs <i>savastanoi</i> . Aplicar con mochila pulverizadora de 5 l. Aplicar en BBCH 00-04, BBCH 11-69 y BBCH 80-85.
Tomate	MILDIU	1,05	1-2	7-14 días	700 l/ha	Eficaz contra <i>Phytophthora infestans</i> . Aplicar con mochila pulverizadora de 5 l. Aplicar entre BBCH 15-89.
Vid	MILDIU	1,5	1-2	7-14 días	1000 l/ha	Eficaz contra <i>Plasmopara viticola</i> . Aplicar con mochila pulverizadora de 5 l. Aplicar entre BBCH 15-81.
	BACTERIOSIS					Aplicar con mochila pulverizadora de 5 l. Aplicar entre BBCH 15-81.





FUNGICIDA

Nayades 70

No superar la dosis máxima de 4 kg/ha y año de Cu (Cu inorgánico).

Observar precauciones por fitotoxicidad propia del cobre, sobren todo en zonas frías y húmedas. En vid no aplicar durante la floración.

PLAZO DE SEGURIDAD:

Para olivo el plazo de seguridad será de 14 días.

Para tomate será de 3 días en tomate fresco y 10 días en tomate de industria

Para vid, el plazo será de 21 días.

**PARA TODA INFORMACIÓN, SOBRE EL USO DE ESTE PRODUCTO
Y EN ESPECIAL TODO LO RELATIVO A RIESGOS Y SEGURIDAD,
LÉASE DETENIDAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
O PÓNGASE EN CONTACTO CON EL SUMINISTRADOR.**

