BRONTES 25 - 12x1L Abr23.pdf 1 26/06/2023 13:20:55

PELIGRO

UFI: 6JA1-V0CW-D00J-YM9X

Líquidos y vapores inflamables./ Nocivo en caso de ingestión./ Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias./ Provoca irritación cutánea./ Provoca lesiones oculares graves./ Puede provocar somnolencia o vértigo. / Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos. /Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar./ Evitar respirar el polvo/ el humo/ el gas/ la niebla/ los vapores/ el aerosol./ Llevar guantes/ prendas/ gafas/ máscara de protección./ EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito./ EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua y jabón./ EN CASO DE INHALACIÓN:Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración./ EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado./ Evitar su liberación al medio ambiente./ Recoger el vertido./ Eliminar el contenido o el recipiente de conformidad con la normativa sobre residuos peligrosos./ Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en un lugar fresco. Mantener el recipiente herméticamente cerrado./ El preparado no se usará en combinación con otros productos.

RECOMENDACIONES PARA CASOS DE INTOXICACIÓN O ACCIDENTE:

Medidas básicas de actuación:

Retire a la persona de la zona contaminada. Quite inmediatamente la ropa manchada salpicada./ En contacto con los ojos, lavar con agua abundante al menos durante 15 minutos, no olvide retirar las lentillas./ En contacto con la piel, lave con agua abundante y jabón, sin frotar./ En caso de ingestión, enjuagarse la boca. No provocar el vómito y no administrar nada por vía oral./ Mantenga el paciente en reposo. Conserve la temperatura corporal./ Controle la respiración. Si fuera necesario, respiración artificial./ Si la persona está inconsciente, acuéstela de lado con la cabeza más baja que le resto del cuerpo y las rodillas semiflexionadas./ Si es necesario traslade al intoxicado a un centro hospitalario y lleve la etiqueta o el envase.

Las manifestaciones clínicas que se pueden producir en caso de exposición y/o contacto son:

Quemaduras en la piel, ojos, mucosas, tracto respiratorio y gastrointestinal con dolor intenso y riesgo de perforación gástrica./ Náuseas, vómitos, vértigo, cefalea y parestesias bucales./ Neumonía química por aspiración y acidosis metabólica./ Dermatitis de contacto y sensibilización./ Reacciones de hipersensibilidad con broncoespasmo.

NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO.

Consejos terapéuticos para médicos y personal sanitario:

En caso de ingestión, descontaminación digestiva según el estado de conciencia./ En caso de ingestión, valorar la realización de endoscopia./ Contraindicación: Lavado gástrico, Neutralización, Carbón activado y Jarabe de Ipecacuana./ Tratamiento sintomático.

EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR ACUDA INMEDIATAMENTE AL MÉDICO O LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA, Tel. 915 620 420. En ambos casos tenga a mano el envaso o la etiqueta.

Mitigación de riesgos en la manipulación: Tanto al aire libre como en invernadero el aplicador utilizará guantes de protección química y ropa de protección tipo 6 contra salpicaduras de productos líquidos según UNE-EN 13034:2005+A1:2009 durante la mezcla/carga y aplicación y el trabajador usará ropa de trabajo adecuada, es decir mono o chaqueta de manga larga y pantalón largo hechos de algodón (> 300 g/m2) o de algodón y poliéster (>200 g/m2) y calzado resistente para la reentrada.

Medidas adicionales de mitigación del riesgo: En la limpieza y mantenimiento del equipo se aplicarán las mismas medidas de protección que en aplicación./ Evitar el contacto con el follaje húmedo durante la aplicación./ No entrar en los cultivos tratados hasta que se haya secado la pulverización./ Durante la aplicación con tractor se deberán usar los guantes de protección química únicamente para manipular el equipo de aplicación o superficies contaminadas.

Otras indicaciones reglamentarias: Lávese toda la ropa de protección después de usarla./ Ventilar las zonas/ los invernaderos tratados (bien/ durante un tiempo especificado/ hasta que se haya secado la pulverización) antes de volver a entrar.

Mitigación de riesgos ambientales: Para proteger los organismos acuáticos respétese sin tratar una banda de seguridad hasta las masas de agua superficial de:- 30 metros en tomate, berenjena, calabacín, pepino y pepinillo tanto en campo como en invernadero. - 30 metros en melón, sandía, fresa y puerro en campo. - 20 metros de los cuales 10 m deben tener cubierta vegetal utilizando boquillas de reducción de deriva del 75 % en coliflor, col y brócoli.- 30 metros en olivo./ Para proteger los artrópodos no objetivo, respétese sin tratar una banda de seguridad de 20 m hasta la zona no cultivada o bien respétese sin tratar una banda de seguridad de 15 m hasta la zona no cultivada utilizando boquillas de reducción de deriva del 30 % en olivo./ Peligroso para las abejas. Para proteger las abejas y otros insectos polinizadores, no aplicar durante la floración de los cultivos. No utilizar donde haya abejas en pecoreo activo. No aplicar cuando las malas hierbas están en floración./ Para su uso en invernadero, no permitir la entrada al invernadero de abejas y otros insectos polinizadores (por ejemplo, cerrar todas las aberturas del invernadero con pantallas)./ Atención: Este producto puede resultar peligroso para los insectos polinizadores. Consultar con proveedor de los insectos polinizadores sobre la compatibilidad de uso de este producto con los polinizadores empleados para determinar el tiempo de espera adecuado entre la aplicación del producto y la introducción de los insectos polinizadores./ Atención: Este producto puede resultar peligroso para los artrópodos no objetivo. Consultar con el proveedor de los artrópodos no objetivo sobre la compatibilidad de uso de este producto con el uso de artrópodos no objetivo.

NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE. (No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales/Evítese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos).

Gestión de envases

Enjuague enérgicamente tres veces cada envase que utilice, vertiendo el agua de lavado al depósito (del pulverizador). Entregar los envases vacíos o residuos de envases bien en los puntos de recogida establecidos por los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada (SIG) o directamente en el punto de venta donde se hubiera adquirido si dichos envases se han puesto en el mercado a través de un sistema de depósito, devolución y retorno.

Brontes25®

INSECTICIDA

Concentrado emulsionable (EC)

Deltametrin 2,5% p/v (25 g/L)

"Contiene Nafta disolvente del petróleo (CAS 64742-94-5) y Alquil bencen sulfonato cálcico (CAS 26264-06-2) con isobutanol (CAS 78-83-1)"

Inscrito en el Registro Oficial de Productos Fitosanitarios con el nº ES-00484

USO RESERVADO A AGRICULTORES Y APLICADORES PROFESIONALES

A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE, SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO

REGISTRADO, FABRICADO Y DISTRIBUIDO POR:

KARYON®

CAF KARYON, S.L.
C/ Ezequiel Solana, 6 - 1ºC
Madrid (28017)
Telf.: 916571269

CONTENIDO NETO 12x1 LITRO

Lote de fabricación: ver envase
Fecha deFabricación: ver envase

® BRONTES, KARYON y KARYON logo son Marcas Registradas de : CAF KARYON, S.L.

• ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO, LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA •

BRONTES 25 es un insecticida de uso profesional en cultivos al aire libre e invernadero.

APLICACIONES AUTORIZADAS

Cultivo*	Plaga/enfermedad	Dosis (L/ha)	Nº aplicaciones	Vol. Caldo (L/ha)	Cond. Específico
Cucurbitáceas de piel comestible (**calabacín**) (A) (I)	**Áfidos, pulgones, Aphididae**: *Aphis gossypii, Myzus persicae* **Noctuidos, Noctuidae:**, *Autagrapha gamma, Helicoperva armígera, Spodoptera littoralis*	0,5	2 (14)	300-1000	Al inicio de la infestación
Cucurbitáceas de piel comestible (**pepino y pepinillo**) (A) (I)	**Áfidos, pulgones, Aphididae**: *Aphis gossypii, Hyperomyzus lactucae* **Noctuidos, Noctuidae:** *Agrotis segetum, Agrotis ipisilon, Helicoperva armígera, Spodoptera sp.*	0,5	2 (14)	300-1000	Al inicio de la infestación
Cucurbitáceas de piel no comestible (**melón**) (A)	**Áfidos, pulgones, Aphididae**: *Aphis gossypii, Myzus persicae* **Noctuidos, Noctuidae:** *Agrotis segetum, Agrotis ipisilon, Autagrapha gamma, Helicoperva armígera, Spodoptera exigua, Spodoptera littoralis*	0,5	2 (14)	300-1000	Al inicio de la infestación
Cucurbitáceas de piel no comestible (**sandía**) (A)	**Áfidos, pulgones, Aphididae**: *Aphis gossypii, Macrosiphum euphorbiae* **Noctuidos, Noctuidae:** *Autagrapha gamma, Helicoperva armígera, Spodoptera exigua, Spodoptera littoralis*	0,5	2 (14)	300-1000	Al inicio de la infestación
Fresal (A)	**Áfidos, pulgones, Aphididae**: *Aphis gossypii, Aphis ruborum, Aulacorthum solani, Chaestosiphon fragaefolii, Myzus persicae* **Noctuidos, Noctuidae:** *Agrotis ipisilon*	0,5	2 (14)	300-1000	Al inicio de la infestación
Hortalizas del género Brassica (**col, coliflor y brócoli**) (A)	**Áfidos, pulgones, Aphididae:** *Brevicoryne brassicae, Lipaphis erysimi, Myzus persicae* **Lepidópteros:** larvas de *Pieris brassicae, Pieris rapae* **Noctuidos, Noctuidae:** *Agrotis segetum, Agrotis ipisilon, Autagrapha gamma, Helicoperva armígera, Mamestra brassicae, Spodoptera littoralis, Plutella xylostella*	0,5	2 (14)	300-1000	Al inicio de la infestación
Olivo (A)	**Prays, polilla del olivo, *Prays oleae***	0,4	1 (-)	800-1000	En floración
Solanáceas (excepto **patata, tomate y berenjena**) (A) (I)	**Áfidos, pulgones, Aphididae**: *Aphis gossypii, Macrosiphum euphorbiae y Myzus persicae* **Noctuidos, Noctuidae:** *Agrotis segetum, Autagrapha gamma, Chrysodeixis chalcites, Helicoperva armígera, Spodoptera exigua, Spodoptera littoralis*	0,5	2 (14)	300-1000	Al inicio de la infestación

* (A): aire libre; (I): Invernadero

CULTIVOS MENORES AUTORIZADOS (por procedimiento nacional)

Cultivo*	Plaga/enfermedad	Dosis (L/ha)	Nº aplicaciones	Vol. Caldo (L/ha)	Cond. Específico
Puerro (A)	**Áfidos, pulgones, Aphididae**: *Aphis gossypii, Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae* **Lepidópteros:** *Agrotis segetum, Autagrapha gamma, Chrysodeixis chalcites, Helicoperva armígera, Spodoptera exigua, Spodoptera littoralis*	0,5	2 (14)	1000	Al inicio de la infestación a dosis de 0,03-0,05%

* (A): aire libre; (I): Invernadero

OBSERVACIONES

El preparado no se usará en combinación con otros productos.

PLAZO DE SEGURIDAD

Olivo: No procede fijarlo.
Cucurbitáceas de piel comestible, Cucurbitáceas de piel no comestible, Fresal y Solanáceas (excepto patata): 3 días.
Hortalizas del género Brassica y Puerro por 7 días.

ADVERTENCIA

Las recomendaciones e información que les facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc.). La Compañía garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta.
Para los usos menores, según el artículo 51.5 del Reglamento (CE) Nº 1107/2009, la persona que utilice el producto será la responsable de la eficacia y fitotoxicidad del producto fitosanitario. Ante la falta de ensayos biológicos realizados por el fabricante, éste no puede garantizar la eficacia ni la ausencia de riesgos fitosanitarios relacionados con la utilización de su producto en los usos menores y declina toda responsabilidad en caso de daños causados a los cultivos.