



HERBICIDA

Fegeo 700

Gránulos dispersables en agua (WG)

HERBICIDA

COMPOSICIÓN: Metribuzina 70% p/p (700 g/kg)

INSCRITO EN EL REGISTRO OFICIAL DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS N°: ES-01156
(DENOMINACIÓN COMÚN: METRIX)

CLASIFICACIÓN TOXICOLÓGICA: ver etiqueta

USO RESERVADO A AGRICULTORES Y APLICADORES PROFESIONALES.
A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE,
SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO.
ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO, LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA.

CARACTERÍSTICAS:

FECEO 700 es un herbicida selectivo que actúa por absorción radicular y foliar contra malas hierbas anuales, gramíneas y dicotiledóneas, en pre-emergencia o post-emergencia precoz de las mismas. Contiene metribuzin, sustancia activa del grupo de las 1,2,4-triazinonas, que actúa como inhibidor del transporte electrónico en la fotosíntesis a nivel del receptor del fotosistema II.

Clasificación del modo de acción de la sustancia activa según HRAC:

| | | |
|--------------|----------|------------------|
| GRUPO | 5 | HERBICIDA |
|--------------|----------|------------------|

USOS, DOSIS Y MODO DE EMPLEO:

| Cultivo | Agente | Dosis (Kg/ha) | Forma y época de aplicación | PS (días) |
|-----------|--|---------------|---|-----------|
| Alfalfa | Dicotiledóneas anuales Monocotiledóneas anuales | 0.75 | Aplicar durante el reposo invernal, antes de la brotación de la parte aérea, en cultivos de más de 2 años. | NP |
| Berenjena | Dicotiledóneas anuales Monocotiledóneas anuales | 0.5 - 0.75 | Uso menor según la jerarquía nacional de cultivos. En caso de siembra directa, aplicar en preemergencia, inmediatamente después de la siembra. Aplicar en preplantación. | NP |
| Cebada | Dicotiledóneas anuales Monocotiledóneas anuales | 0.1 | Exclusivamente para cebada ciclo largo. Aplicar en preemergencia. | NP |
| Patata | Dicotiledóneas anuales Monocotiledóneas anuales | 0.75 | Aplicar en preemergencia. | NP |





HERBICIDA

Fegeo 700

| Cultivo | Agente | Dosis (Kg/ha) | Forma y época de aplicación | PS (días) |
|---------|--|---------------|---|-----------|
| Soja | Dicotiledóneas anuales Monocotiledóneas anuales | 0.25 - 0.35 | Uso menor según la jerarquía nacional de cultivos. Aplicar en preemergencia. | NP |
| Tomate | Dicotiledóneas anuales Monocotiledóneas anuales | 0.5 - 0.75 | En caso de siembra directa, aplicar en preemergencia, inmediatamente después de la siembra. Aplicar en preplantación. | NP |
| Trigo | Dicotiledóneas anuales Monocotiledóneas anuales | 0.1 | Exclusivamente para trigo ciclo largo. Aplicar en preemergencia. | NP |

PS: Plazo de seguridad; NP: No procede

MODO DE EMPLEO:

Aplicar por pulverización foliar mecánica al aire libre utilizando un volumen de caldo de 200 – 500 l/ha. Realizar una única aplicación por campaña.

OBSERVACIONES:

No utilizar en terrenos muy arenosos.
El preparado no se usará en combinación con otros productos.

PARA TODA INFORMACIÓN SOBRE EL USO DE ESTE PRODUCTO Y EN ESPECIAL TODO LO RELATIVO A RIESGOS Y SEGURIDAD, LÉASE DETENIDAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO O PÓNGASE EN CONTACTO CON EL SUMINISTRADOR.

