



HERBICIDA

Partenope 800[®]

Concentrado emulsionable (EC)

HERBICIDA SELECTIVO PARA EL CONTROL DE MALAS HIERBAS

COMPOSICIÓN: Prosulfocarb 80 % p/v (800 g/L)

INSCRITO EN EL REGISTRO O. DE P. Y M. F., CON EL N°: ES-00293

USO RESERVADO A AGRICULTORES Y APLICADORES PROFESIONALES
A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE,
SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO

MODO DE ACCIÓN

PARTENOPE 800 es un herbicida de aplicación pre o post emergencia temprana en trigo y cebada de invierno. PARTENOPE 800 está formulado a base de prosulfocarb, que es absorbido por las raíces, hojas y semillas cuando éstas germinan y se trasloa a las zonas meristemáticas. El prosulfocarb actúa inhibiendo la síntesis de los lípidos provocando alteración de la membrana celular. La sintomatología que produce se caracteriza por la aparición de un color verde oscuro, enrollamiento, inhibición de brotes y raíz y fallo de la emergencia de la hoja desde el coletilo.

APLICACIONES Y DOSIS AUTORIZADAS

Cultivo	Objetivo	Dosis	No de aplicaciones	Momento de la aplicación
Trigo y cebada de invierno	Malas hierbas anuales	4-5 L/ha (*)	1	Aplicar en pre-emergencia de malas hierbas o cuando estas tienen menos de 2 hojas y el cultivo un máximo de 2 hojas (BBCH 12)

(*) En aplicaciones en post-emergencia temprana, utilizar una dosis máxima de 4 L/ha.

MODO DE EMPLEO

Aplicar en pulverización normal con un gasto de caldo entre 200-400 L/ha. Se aconseja el uso de boquillas de abanico 110° con una presión de pulverización baja (2-3 kg/cm²).





HERBICIDA

RECOMENDACIONES

En ningún caso se aplicará en cultivos de cereales cuya siembra haya sido efectuada en malas condiciones, sobre todo si la semilla ha quedado muy superficial (profundidad óptima 20-30 mm).

PARTENOPE 800 es eficaz en el control de gramíneas anuales: (*Apera spica-venti*, *Poa annua*, *Poa trivialis*, *Alopecurus myosuroides*, *Lolium sp* (Vallico) y dicotiledóneas anuales (*Galium aparine*, *Anthemis arvensis* (Manzanilla salvaje), *Stellaria media*, *Lamium purpureum*, *Fumaria officinalis*, *Solanum nigrum*, *Atriplex patula*, *Chenopodium album*, *Thlaspi arvense*, *Veronica spp.*, *Capsella bursa-pastoris*, *Myosotis arvensis*, *Anthemis spp.*, *Viola arvensis*, etc.).

Para mejorar la eficacia contra *Galium*, *Veronica* o en presencia de una infestación variada de malas hierbas, PARTENOPE 800 se podrá mezclar con otros herbicidas autorizados en cereal.

RESTRICCIONES

En caso de pérdida de la cosecha de un cultivo primario tratado con Prosulfocarb, se recomienda sembrar/plantar solo patatas, trigo o cebada.

PLAZO DE SEGURIDAD

No procede por la época de aplicación del producto.

CLASIFICACIÓN



Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Evitar respirar la niebla.

Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.

Llevar guantes/ropa de protección/gafas/ máscara de protección.

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua y jabón sin frotar.

Evitar su liberación al medio ambiente.

Recoger el vertido.

Eliminar el contenido o el recipiente en un gestor de residuos autorizado.





HERBICIDA

ADVERTENCIA

Las recomendaciones e información de facilitamos son fruto de amplios y rigurosos ensayos y estudios. Sin embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc.). La Compañía garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta.

**PARA TODA INFORMACIÓN, SOBRE EL USO DE ESTE PRODUCTO
Y EN ESPECIAL TODO LO RELATIVO A RIESGOS Y SEGURIDAD,
LÉASE DETENIDAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
O PÓNGASE EN CONTACTO CON EL SUMINISTRADOR.**

