



INSECTICIDA



Concentrado Emulsionable (EC)

Insecticida-acaricida natural que actúa por contacto e ingestión

COMPOSICIÓN: **Abamectina 1,8% p/v (18 g/l)**

Inscrito en el Registro Oficial de Productos y Material Fitosanitario con el No. **24.574**
USO RESERVADO A AGRICULTORES Y APLICADORES PROFESIONALES A FIN DE EVITAR RIESGOS
PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE, SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO

Clasificación del modo de acción de la sustancia activa según IRAC

GRUPO	6	INSECTICIDA
-------	----------	-------------

USOS AUTORIZADOS Y DOSIS

Acaricida insecticida de acción translaminar que actúa por contacto y por ingestión.

Aplicar en invernaderos permanentes mediante pulverización normal manual con lanza/pistola y mochila.

CULTIVOS	PLAGAS	Nombre científico	DOSIS	Nº APLIC.	DÍAS DE INTERVALO	VOL. CALDO (l/ha)
BERENJENA	Ácaros	-	0,3 - 0,8 l/ha	Máx. 2	20	600 - 1000
CUCURBITÁCEAS DE PIEL COMESTIBLE	Ácaros	-	0,15 - 1 l/ha	Máx. 2	7	300 - 1000
	Liriomiza	<i>Liriomyza spp</i>				
CUCURBITÁCEAS DE PIEL NO COMESTIBLE	Ácaros	-	0,15 - 1 l/ha	Máx. 2	7	300 - 1000
	Liriomiza	<i>Liriomyza spp</i>				
FRESAL	Ácaros	-	0,15 - 1 l/ha	Máx. 2	7	300 - 1000
	Liriomiza	<i>Liriomyza spp</i>				
TOMATE	Ácaros	-	0,15 - 1 l/ha	Máx. 3	7	300 - 1000
	Liriomiza	<i>Liriomyza spp</i>				

PLAZOS DE SEGURIDAD

El tiempo mínimo que debe transcurrir entre el último tratamiento y la recolección es de:

- Berenjena, cucurbitáceas de piel comestible, cucurbitáceas de piel no comestible, fresal, tomate: 3 días.

FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Berenjena: aplicar en invernaderos permanentes al inicio del ataque.





INSECTICIDA

Cucurbitáceas de piel comestible: aplicar en invernaderos permanentes durante la plaga.

Cucurbitáceas de piel no comestible: aplicar en invernaderos permanentes durante la plaga.

Fresal: aplicar en invernaderos permanentes en el momento de la infestación. Aplicar únicamente de marzo a octubre.

Tomate: aplicar en invernaderos permanentes durante la plaga.

PRECAUCIONES

-Para evitar problemas de resistencias, no tratar más de 3 veces al año y alternar con acaricidas de distinto modo de acción para evitar la aparición de las mismas.

-SPa1: A efectos de prevenir la aparición de resistencias, no efectuar con este producto ni con ningún otro que contenga abamectina más de 3 aplicaciones al año y alternar con acaricidas de distinto modo de acción.

-El preparado no se usará en combinación con otros productos.

CLASIFICACIÓN

PELIGRO



Líquidos y vapores inflamables.

Nocivo en caso de ingestión.

Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.

Provoca lesiones oculares graves.

Puede provocar somnolencia o vértigo.

Puede provocar daños en el sistema nervioso tras exposiciones prolongadas o repetidas.

Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.

PARA TODA INFORMACIÓN, SOBRE EL USO DE ESTE PRODUCTO Y EN ESPECIAL TODO LO RELATIVO A RIESGOS Y SEGURIDAD, LÉASE DETENIDAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO O PÓNGASE EN CONTACTO CON EL SUMINISTRADOR

