



INSECTICIDA

Brontes25

CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

Insecticida que actúa por contacto e ingestión

COMPOSICIÓN: Deltametrina 2.5% p/v (25 g/l)

INSCRITO EN EL REGIS OFICIAL DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS CON EL No. **ES-00484**

ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO, LÉASE DETENIDAMENTE LA ETIQUETA
USO RESERVADO A AGRICULTORES Y APLICADORES PROFESIONALES
A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE,
SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO

CHARACTERISTICAS

BRONTES 25 es un insecticida de uso profesional en cultivos al aire libre e invernadero. Actúa por contacto e ingestión contra un amplio espectro de plagas. Dotado de una rápida acción inicial, consigue una suficiente protección vegetal con gran seguridad de uso.

USOS AUTORIZADOS Y DOSIS

Cultivo	Plaga	Dosis (L/h)	No. de aplicación	V. caldo (L/ha)	Cond. específicas
Cucurbitáceas de piel comestible (calabacín) (AL) (I)	Áfidos, pulgones, Aphididae: <i>Aphis gossypii</i> , <i>Myzus persicae</i> . Noctuidos, Noctuidae: <i>Autographa gamma</i> , <i>Helicoverpa armigera</i> , <i>Spodoptera littoralis</i>	0.5	2(14)	300-1000	Al inicio de la infestación
Cucurbitáceas de piel comestible (pepino y pepinillo) (AL) (I)	Áfidos, pulgones, Aphididae: <i>Aphis gossypii</i> , <i>Hyperomyzus lactucae</i> Noctuidos, Noctuidae: <i>Agrotis segetum</i> , <i>Agrotis ipisilon</i> , <i>Helicoverpa armigera</i> , <i>Spodoptera sp.</i>	0.5	2(14)	300-1000	Al inicio de la infestación
Cucurbitáceas de piel no comestible (melón) (AL)	Áfidos, pulgones, Aphididae: <i>Aphis gossypii</i> , <i>Myzus persicae</i>	0.5	2(14)	300-1000	Al inicio de la infestación





INSECTICIDA

	Noctuidos, Noctuidae: <i>Agrotis segetum</i> , <i>Agrotis ipisilon</i> , <i>Autographa gamma</i> , <i>Helicoverpa armigera</i> , <i>Spodoptera exigua</i> , <i>Spodoptera littoralis</i>				
Cucurbitáceas de piel no comestible (sandía) (AL)	Áfidos, pulgones, Aphididae: <i>Aphis gossypii</i> , <i>Macrosiphum euphorbiae</i> Noctuidos, Noctuidae: <i>Autographa gamma</i> , <i>Helicoverpa armigera</i> , <i>Spodoptera exigua</i> , <i>Spodoptera littoralis</i>	0.5	2(14)	300-1000	Al inicio de la infestación
Fresal (AL)	Áfidos, pulgones, Aphididae: <i>Aphis gossypii</i> , <i>Aphis ruborum</i> , <i>Aulacorthum solani</i> , <i>Chaetosiphon fragaefolii</i> , <i>Myzus persicae</i> Noctuidos, Noctuidae: <i>Agrotis ipisilon</i>	0.5	2(14)	300-1000	Al inicio de la infestación
Hortalizas del género Brassica (col, coliflor y brócoli) (AL)	Áfidos, pulgones, Aphididae: <i>Brevicoryne brassicae</i> , <i>Lipaphis erysimi</i> , <i>Myzus persicae</i> Lepidópteros: larvas de <i>Pieris brassicae</i> , <i>Pieris rapae</i> Noctuidos, Noctuidae: <i>Agrotis segetum</i> , <i>Agrotis ipisilon</i> , <i>Autographa gamma</i> , <i>Helicoverpa armigera</i> , <i>Mamestra brassicae</i> , <i>Spodoptera littoralis</i> , <i>Plutella xylostella</i>	0.5	2(14)	300-1000	Al inicio de la infestación
Olive (F)	Prays, polilla del olivo, <i>Prays oleae</i>	0.4	1(-)	800-1000	En floración
Solanáceas*, Tomate y berenjena	Aphids: <i>Aphis gossypii</i> ,	0.5	2(14)	300-1000	Al inicio de la infestación





INSECTICIDA

(AL) (I) (*excepto patata)	<i>Macrosiphum euphorbiae</i> y <i>Myzus persicae</i> Noctuidae: <i>Agrotis segetum</i> , <i>Autographa gamma</i> , <i>Chrysodeixis chalcites</i> , <i>Helicoverpa armigera</i> , <i>Spodoptera exigua</i> , <i>Spodoptera littoralis</i>				
Puerro (AL)	Áfidos, pulgones, Aphididae: <i>Aphis gossypii</i> , <i>Macrosiphum euphorbiae</i> , <i>Myzus persicae</i> Lepidópteros: <i>Agrotis segetum</i> , <i>Autographa gamma</i> , <i>Chrysodeixis chalcites</i> , <i>Helicoverpa armigera</i> , <i>Spodoptera exigua</i> , <i>Spodoptera littoralis</i>	0.5	2(14)	1000	Al inicio de la infestación a dosis de 0.03-0.05%

(AL): Aire libre / (I): Invernadero.

CLASIFICACIÓN

PELIGRO



Líquidos y vapores inflamables

Nocivo en caso de ingestión.

Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.

Provoca irritación cutánea.

Provoca lesiones oculares graves.

Puede provocar somnolencia o vértigo.

Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.

OBSERVACIONES

El preparado no se usará en combinación con otros productos.



Caf KARYON, SL - www.karyon.es - ® Marca y Logo Registrados de Caf KARYON, SL

Oficina Comercial C/ Chile, 10. 28290 LAS ROZAS, Madrid ☎ 91 594 69 70 @ comercial@karyon.es

Administración ☎ 957 651 400 @ karyon@karyon.es - Registros y Asuntos Regulatorios ☎ 626 861 973 @ registros@karyon.es



INSECTICIDA

PLAZO DE SEGURIDAD

Olivo: No procede fijarlo.

Cucurbitáceas de piel comestible, Cucurbitáceas de piel no comestible, Fresal y Solanáceas (excepto patata): 3 días.

Hortalizas del género Brassica y Puerro por 7 días.

PARA TODA INFORMACIÓN, SOBRE EL USO DE ESTE PRODUCTO Y EN ESPECIAL TODO LO RELATIVO A RIESGOS Y SEGURIDAD, LÉASE DETENIDAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO O PÓNGASE EN CONTACTO CON EL SUMINISTRADOR.

