



HERBICIDA



CONCENTRADO SOLUBLE (SL)

HERBICIDA

COMPOSICIÓN: Clopiralida 30% p/v (c. sal monoetanolamina) (300 g/L)
(26.27% p/p)

Inscrito en el Registro Oficial de Productos Fitosanitarios con el No. **ES-01658**

USO RESERVADO A AGRICULTORES Y APLICADORES PROFESIONALES

A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE, SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO

CARACTERÍSTICAS

EACO® es un herbicida sistémico, selectivo, absorbido por las hojas y raíces, con translocación acrópeta y basípeta, eficaz para el control de un amplio espectro de malas hierbas dicotiledóneas anuales y perennes. Contiene clopiralida como sustancia activa, que es una auxina sintética, perteneciente a la familia química de los piridina-carboxilatos.

Clasificación del modo de acción de la sustancia activa según HRAC:

GRUPO 4 HERBICIDA

APLICACIONES Y DOSIS AUTORIZADAS

Cultivo	Agente	Dosis (L/ha)	Forma y época de aplicación	Volumen de caldo (L/ha)	Plazo de seguridad (días)
Cebada de invierno, Trigo de invierno	Dicotiledóneas, malas hierbas de hoja ancha	0.3	No aplicar antes del 30 de marzo. Aplicar durante BBCH 30-31.	200-400	NP
Cebada de primavera	Dicotiledóneas, malas hierbas de hoja ancha	0.3	Si la aplicación se realiza en BBCH 18-29: aplicar solo una vez cada 2 años. Si la aplicación es en BBCH 30-31, se puede aplicar una vez al año.	200-400	NP
Colza de invierno y primavera	Dicotiledóneas, malas hierbas de hoja ancha	0.33	Uso menor por jerarquía de cultivos. <u>Colza de invierno</u> : aplicar solo en primavera y después del 26 de marzo, durante BBCH 21-25. <u>Colza de primavera</u> : aplicar durante BBCH 12-25.	200-400	NP
Maíz	Dicotiledóneas, malas hierbas de hoja ancha	0.33	Aplicar solo una vez cada dos años si se aplica en BBCH 12-17. Si se aplica en BBCH 18, se puede aplicar una vez al año.	200-400	NP



Caf KARYON, SL - www.karyon.es - ® Marca y Logo Registrados de Caf KARYON, SL

Oficina Comercial C/ Chile, 10. 28290 LAS ROZAS, Madrid ☎ 91 594 69 70 @ comercial@karyon.es

Administración ☎ 957 651 400 @ karyon@karyon.es - Registros y Asuntos Regulatorios ☎ 626 861 973 @ registros@karyon.es



HERBICIDA

Remolacha azucarera	Cardo, Cirsium arvense	0.3-0.4	Dosis: 0.3 l/ha: -No aplicar antes del 30 de marzo. -Si se aplica durante BBCH 12-19, aplicar una vez cada 3 años. -Si se aplica durante BBCH 20-33, aplicar una vez cada 2 años. A partir de 0.3 l/ha. hasta 0.4 l/ha: -Aplicar solo durante BBCH 20-33 y solo una vez cada 3 años.	200-400	NP
---------------------	------------------------	---------	---	---------	----

MODO DE EMPLEO

Aplicar en pulverización foliar mecánica.
Realizar una única aplicación por campaña.

OBSERVACIONES

Se recomienda esperar un intervalo de 125 días antes de plantar nuevos cultivos tras la aplicación del producto. Para la implantación de cultivos en un plazo inferior a 125 días, no se debe aplicar clopiralida.

CLASIFICACIÓN



ATENCIÓN

H410: Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.

ADVERTENCIA

Las recomendaciones e información de facilitamos son fruto de amplios y rigurosos ensayos y estudios. Sin embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc.). La Compañía garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta.

PARA TODA INFORMACIÓN, SOBRE EL USO DE ESTE PRODUCTO Y EN ESPECIAL TODO LO RELATIVO A RIESGOS Y SEGURIDAD, LÉASE DETENIDAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO O PÓNGASE EN CONTACTO CON EL SUMINISTRADOR.

