



# HERBICIDA



## SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

### HERBICIDA SELECTIVO CON ACTIVIDAD POR CONTACTO SOBRE EL COLEÓPTILO Y EL HIPOCÓTILO DE LAS MALAS HIERBAS

COMPOSICIÓN: Aclonifen 60% p/v

Inscrito en el Registro Oficial de Productos Fitosanitarios con el No. **ES-01498**

USO RESERVADO A AGRICULTORES Y APLICADORES PROFESIONALES  
A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE, SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO

#### CARACTERÍSTICAS

ELIXTA es un herbicida selectivo con actividad por contacto sobre el coleóptilo y el hipocótilo de las malas hierbas, que no es absorbido por las raíces. Su translocación en el interior de la planta es muy limitada y su persistencia se prolonga durante 2-3 meses.

ELIXTA controla hierbas de hoja ancha en pre-emergencia y post-emergencia (estado óptimo: entre cotiledones verdes y 2 hojas).

#### Clasificación del modo de acción de la sustancia activa según HRAC:

**GRUPO 32 HERBICIDA**

#### APLICACIONES Y DOSIS AUTORIZADAS

Cultivo	Efecto	Dosis	Momento y condiciones de aplicación
Ajo	Dicotiledóneas anuales Dicotiledóneas plurianuales	2.5 l/ha	Aplicar en preemergencia a la dosis indicada o en post-emergencia razón de 0,75-1,25 l/ha. Volumen de caldo: 150-400 l/ha
Apio	Dicotiledóneas anuales Dicotiledóneas plurianuales	2.5 l/ha	Aplicar en pos-trasplante del cultivo y pre-emergencia de las malas hierbas. Volumen de caldo: 150-400 l/ha
Caléndulas	Dicotiledóneas anuales Dicotiledóneas plurianuales	2.5 l/ha	Exclusivamente para consumo alimentario. Tratar en preemergencia del cultivo a dosis de 2,5 l/ha. Volumen de caldo: 150-400 l/ha
Cebolla	Dicotiledóneas anuales Dicotiledóneas plurianuales	2-2.5 l/ha	Aplicar en pre-emergencia a la dosis indicada o en post-emergencia (BBCH≤12) razón de 2 l/ha. Volumen de caldo: 150-400 l/ha
Cebollino	Dicotiledóneas anuales Dicotiledóneas plurianuales	2-2.5 l/ha	Aplicar en pre-emergencia. Volumen de caldo: 150-400 l/ha
Chalote	Dicotiledóneas anuales Dicotiledóneas plurianuales	0.25-1 l/ha	Tratar en post-emergencia del cultivo (BBCH≤12).





# HERBICIDA

Cultivo	Efecto	Dosis	Momento y condiciones de aplicación
Chirivía	Dicotiledóneas anuales Dicotiledóneas plurianuales	2.5 l/ha	Aplicar en pre-emergencia. Volumen de caldo: 150-400 l/ha
Girasol	Dicotiledóneas anuales Dicotiledóneas plurianuales	2.5-4 l/ha	Aplicar en pre-emergencia. Volumen de caldo: 300-500 l/ha
Guisante verde	Dicotiledóneas anuales Dicotiledóneas plurianuales	2.5-4 l/ha	Para producción con vaina (se incluye el tirabeque) y sin vaina. Aplicar en pre-emergencia. Volumen de caldo: 300-500 l/ha
Hierbas aromáticas y flores comestibles	Dicotiledóneas anuales Dicotiledóneas plurianuales	1-2.5 l/ha	Incluye únicamente cilantro, eneldo, perejil, genciana y angélica: -Cilantro, eneldo y perejil: Tratar en preemergencia del cultivo a dosis de 2,5 l/ha. -Genciana: Aplicar en pre-emergencia o post-emergencia temprana del cultivo (BBCH≤12), a dosis máxima de 1 l/ha. -Angélica: Tratar en post-emergencia del cultivo. Aplicar a partir de 3-4 hojas a dosis de 1 l/ha. Volumen de caldo: 150-400 l/ha
Hinojo	Dicotiledóneas anuales Dicotiledóneas plurianuales	2.5 l/ha	Exclusivamente para consumo de hojas. Aplicar en pre-emergencia. Volumen de caldo: 150-400 l/ha
Leguminosas de grano	Dicotiledóneas anuales Dicotiledóneas plurianuales	2.5-4 l/ha	Aplicar en pre-emergencia. Volumen de caldo: 300-500 l/ha
Manzanillas	Dicotiledóneas anuales Dicotiledóneas plurianuales	2.5 l/ha	Aplicar en pre-emergencia Volumen de caldo: 150-400 l/ha
Patata	Dicotiledóneas anuales Dicotiledóneas plurianuales	2.5-4 l/ha	Aplicar en pre-emergencia No aplicar en presencia de brotes de tubérculos ya emergidos o con grietas abiertas en el terreno. No aplicar en Monalisa Volumen de caldo: 300-500 l/ha
Tabaco	Dicotiledóneas anuales Dicotiledóneas plurianuales	2.5 l/ha	Aplicar en preplantación. Volumen de caldo: 150-400 l/ha
Zanahoria	Dicotiledóneas anuales Dicotiledóneas plurianuales	2.5 l/ha	Realizar un máximo de 2 aplicaciones. Tratar en pre-emergencia del cultivo con una aplicación a dosis de 2,5 L/ha o bien 1,5 L/ha en pre-emergencia seguido de 1 L/ha en post-emergencia temprana (BBCH≤12). Volumen de caldo: 150-400 l/ha

## Condicionamientos generales

Tratamiento herbicida al aire libre, aplicar en pulverización normal con tractor.

Controla malas hierbas en pre-emergencia y post-emergencia (estado óptimo: entre cotiledones verdes y 2 hojas).

Una vez aplicado el producto no debe trabajarse el suelo. Para una buena acción herbicida se precisa cierta humedad en el terreno. No aplicar si se cultiva adormidera en parcelas colindantes.

No aplicar en cultivo sometido a condiciones de estrés.

No aplicar en patata Monalisa.

Malas hierbas sensibles: *Amaranthus sp*, *Capsella bursa-pastoris*, *Chenopodium sp*, *Diplotaxis sp*, *Galium aparine*, *Lamium sp*, *Matricaria chamomilla*, *Papaver rhoeas*,





# HERBICIDA

*Raphanus raphanistrum, Setaria verticilata, Sinapis arvensis, Sonchus sp, Stellaria media, Viola arvensis, Veronica sp*, entre otras.

Malas hierbas resistentes: *Aethusa cynapium, Ambrosia elatior, Avena ludoviciana, Cirsium arvense, Convolvulus arvensis, Chrozophora tinctoria, Cynodon dactylon, Ecballium elaterium, Portulaca oleracea, Setaria viridis, Solanum nigrum* y *Viola tricolor*.

## Preparación del caldo

Verter la cantidad necesaria de producto en el tanque del pulverizador, llenado hasta la mitad, con el agitador en funcionamiento, y completar el volumen de agua necesario.

## PLAZO DE SEGURIDAD

70 días en chirivía, chalote, zanahoria y genciana;

90 días en apio, angélica, caléndula, cilantro, eneldo, hinojo, manzanilla y perejil;

No procede en ajos, cebolla, cebollino, girasol, guisantes verdes, leguminosas de grano, patata y tabaco.

## CLASIFICACIÓN



### ATENCIÓN

Se sospecha que provoca cáncer.

Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

### Almacenamiento

Almacenar en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Mantenga el producto en su embalaje original, alejado de alimentos, bebidas y piensos.

**PARA TODA INFORMACIÓN, SOBRE EL USO DE ESTE PRODUCTO Y EN ESPECIAL TODO LO RELATIVO A RIESGOS Y SEGURIDAD, LÉASE DETENIDAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO O PÓNGASE EN CONTACTO CON EL SUMINISTRADOR.**

