



HERBICIDA

Hileo TS

Concentrado soluble (SL)

HERBICIDA SISTÉMICO, NO SELECTIVO Y DE ACCIÓN FOLIAR

COMPOSICIÓN: **Glifosato 36% (sal isopropilamina) p/v (360 g/l)**

Inscrito en el Registro Oficial de Productos Fitosanitarios con el No. **ES-00750**

USO RESERVADO A AGRICULTORES Y APLICADORES PROFESIONALES

A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE, SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO

CARACTERÍSTICAS

HILEO TS es un herbicida no selectivo a base de Glifosato, sistémico de postemergencia, de acción foliar y aplicación localizada que, una vez absorbido por las hojas, es traslocado hacia las raíces y órganos de reserva, donde desempeña su función herbicida. En el suelo se inactiva, por lo que no tiene efecto residual alguno.

APLICACIONES Y DOSIS AUTORIZADAS

USO	AGENTE	DOSIS (L/ha)	Vol. Caldo (L/h)	PS
Árboles y arbustos frutales	Dicotiledóneas anuales Monocotiledóneas anuales Dicotiledóneas plurianuales	3 - 6	-	NP
	Monocotiledóneas plurianuales	6-7.6	25 - 30 (ver condicionamientos generales)	NP
Herbáceas extensivas	Dicotiledóneas anuales Monocotiledóneas anuales	1.5-2.5	25 - 30 (ver condicionamientos generales)	NP
Herbáceas intensivas	Dicotiledóneas anuales Monocotiledóneas anuales	1.5-2.5	25 - 30 (ver condicionamientos generales)	NP





HERBICIDA

Condicionamiento Especifico

Árboles y arbustos Frutales: Exclusivamente para platanera, olivo, vid, peral, manzano, cítricos, melocotonero, ciruelo, cerezo, almendro y avellano. Las aplicaciones deberán realizarse entre líneas y en la base del tronco, aplicando a un máximo del 33% del área cultivada. Se deberá evitar todo posible contacto de los frutos con el producto o con el suelo tratado. Aplicar en postemergencia precoz con malas hierbas en crecimiento activo. No aplicar a BBCH>71.

Herbáceas extensivas: No incluye haba ni algodónero.

Dosis máxima por aplicación: 2,5 l/ha.

Aplicar en pre-siembra y/o pre-emergencia del cultivo y en post-emergencia de la vegetación adventicia.

Herbáceas intensivas: No incluye haba.

Dosis máxima por aplicación: 2,5 l/ha.

Aplicar en pre-siembra y/o pre-emergencia del cultivo y en post-emergencia de la vegetación adventicia.

MODO DE EMPLEO

Tratamiento herbicida para el control de malas hierbas anuales y plurianuales:

Herbáceas extensivas e intensivas: En pulverización normal (manual o tractor): 1.5-2.5 L/ha
Volumen de caldo: 25- 30 l/ha.

Árboles y arbustos frutales:

En pulverización centrifuga (manual o tractor): 3 L/ha. Volumen de caldo: 25 l/ha.

En pulverización con disco atomizador rotatorio (manual): 3 L/ha. Volumen de caldo: 30 l/ha.

En pulverización normal (manual o tractor): 3-7.6 L/ha Volumen de caldo: 25-30 l/ha

En pulverización con disco atomizador rotatorio (tractor): 3-6 L/ha. Volumen de caldo: 25-30 l/ha.

No aplicar durante lluvias intensas. Adaptar el volumen de caldo para no superar el máximo de dosis por ha y aplicación en cada caso.



CLASIFICACIÓN

Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

PARA TODA INFORMACIÓN, SOBRE EL USO DE ESTE PRODUCTO Y EN ESPECIAL TODO LO RELATIVO A RIESGOS Y SEGURIDAD, LÉASE DETENIDAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO O PÓNGASE EN CONTACTO CON EL SUMINISTRADOR.

