



FUNGICIDA



CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

Fungicida para el control de enfermedades foliares y de la espiga en trigo y cebada y para el control de enfermedades en la colza

COMPOSICIÓN: AZOXISTROBIN 14% p/v + PROTIOCONAZOL 10% p/v

Inscrito en el Registro Oficial de P. y M. F. con el N° ES-01770

**USO RESERVADO A AGRICULTORES Y APLICADORES PROFESIONALES.
A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE, SIGA LAS
INSTRUCCIONES DE USO**

CARACTERÍSTICAS

NEFELE DUO es un fungicida de amplio espectro para cereales que combina dos fungicidas altamente activos: azoxistrobin y protioconazol. El azoxistrobin es un fungicida translaminar sistémico y protector, perteneciente al grupo de fungicidas estrobilurina QoI (código FRAC 11). La azoxistrobina inhibe la respiración fúngica, lo que provoca la disrupción de la membrana. El protioconazol pertenece al grupo de las triazolintionas y al grupo FRAC G1, código 3 (fungicidas IDM). El protioconazol inhibe la biosíntesis de esteroides. Su doble mecanismo de acción mejora el control y la gestión de la resistencia y proporciona una actividad sistémica y protectora superior. Aplique NEFELE DUO ante los primeros signos de infestación para limitar el desarrollo de enfermedades foliares.

CONDICIONES GENERALES DE USO

Tratamiento fungicida al aire libre por pulverización foliar con tractor.

APLICACIONES AUTORIZADAS Y DOSIS

USO	AGENTE	Dosis (L/ha)	No. Aplic.	Intv. (días)	Vol. Caldo	Forma y época de aplicación
Cebada	Helminthosporiosis reticular de la cebada, <i>Pyrenophora teres</i>	0.7-1.4	2	14-21	200-400	Indicado para cebada de invierno. Aplicar durante BBCH 30-59.
Cebada	Rincosporiosis, escaldado de cereales, <i>Rhynchosporium secalis</i>	0.7-1.4	2	14-21	200-400	Indicado para cebada de invierno. Aplicar durante BBCH 30-59.





FUNGICIDA

USO	AGENTE	Dosis (l/ha)	Nº Aplic.	Intervalos	Vol. Caldo	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico)
Colza	Podredumbre blanca, <i>Sclerotinia sclerotiorum</i>	0.6 – 1.2	1	--	200 - 400	(Uso menor por jerarquía) Indicado para colza de primavera e invierno. Aplicar durante BBCH 59-69.
Trigo	Roya amarilla del trigo, <i>Puccinia striiformis</i>	0.7 – 1.4	2	14-21	200 - 400	Indicado para trigo blando de invierno y trigo duro de invierno. Aplicar durante BBCH 30-59.
Trigo	Septorios del trigo, <i>Zymoseptoria tritici</i>	0.7 – 1.4	2	14-21	200 - 400	Indicado para trigo blando de invierno y trigo duro de invierno. Aplicar durante BBCH 30-59.
Trigo	Fusariosis, <i>Fusarium</i> spp.	0.7 – 1.4	2	14-21	200 - 400	Indicado para trigo blando de invierno y trigo duro de invierno. Aplicar durante BBCH 59-69.

PLAZO DE SEGURIDAD

No procede.

CLASIFICACIÓN

PELIGRO



H302 - Nocivo en caso de ingestión.

H315 - Provoca irritación cutánea.

H318 - Provoca lesiones oculares graves.

H410 - Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.





FUNGICIDA

ADVERTENCIAS

Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización, pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc.). La compañía garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta.

PARA TODA INFORMACIÓN SOBRE EL USO DE ESTE PRODUCTO Y EN ESPECIAL TODO LO RELATIVO A RIESGOS Y SEGURIDAD, LÉASE DETENIDAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO O PÓNGASE EN CONTACTO CON EL SUMINISTRADOR.

