cbo_vlk=_=jç=Ri=NRNMOSKéÇÑ===N===NRLNMLOMOS===NNWMQWRV

FERBYON B Mo

POWERED BY KARYON TECHNOLOGY

ABONO LIQUIDO CON *ASCOPHYLLUM NODOSUM* Y MICRONUTRIENTES PARA PREPARACIÓN DE SOLUCIONES NUTRITIVAS

Manitol: 0,5% m/m
Boro (B) soluble en agua 6 % m/m
Molibdeno (Mo) soluble en agua 3 % m/m
Conductividad eléctrica = 35,5 dS/m

pH 8,0
Densidad 1,254 g

CAE INSUMOS UNE 142500

"Producto fertilizante autorizado para su uso en producción ecológica de conformidad con el Reglamento (UE) 2018/848. Cumple con la Norma UNE 142500."

INNOVATIVE SME
Valid until Feb 7th 2026

CONTENIDO NETO:
5 Litros
(6,27 kg)

® FERBYON, KARYON y KARYON logo son Marca Registrada de Caf KARYON, SL

KARYON®

cbo_vlk=_=jç=Ri=NRNMOSKéÇÑ===O===NRLNMLOMOS===NNWMRWMM

FERBYON B Mo

POWERED BY KARYON TECHNOLOGY

FERBYON B Mo esta desarrollado para su empleo en la prevención y control de estados carenciales de boro y Molibdeno que junto a la tecnología KFM.

El molibdeno de la máxima calidad aportado en FERBYON B Mo.

MODO DE EMPLEO: Dosis general: 0,6-2 litros/ha y aplicación. Regular el pH del agua a valores no superiores a 7.

· **Aplicación foliar: Hortícolas, Frutales (hueso, pepita, cascara), Cítricos, Viña, Olivo, Fresa, Cultivos forrajeros, Cereales, Algodón, Colza, Girasol, parques y jardines**: Hortícolas 100-300cc/hl resto de cultivos 150-300cc/hl pre-floración. En frutales se recomienda dos aplicaciones en pre-floración y floración.

· **Aplicación a través de fertirrigación: Hortícolas, Frutales (hueso, pepita, cascara), Cítricos, Viña, Olivo, Fresa, Cultivos forrajeros, Cereales, Algodón, Colza, Girasol**: 2 l/ha realizando de 2 a 6 aplicaciones a lo largo del ciclo del cultivo según necesidades. En frutales hueso, pepita y cascara aplicar en pre-floración y postcosecha.

Evitar su aplicación por encima de 30 grados.

KARYON

Caf KARYON, S.L.
Apartado de Correos nº 50
Ciudad Santo Domingo - 28120 Madrid
Tel.: (+34) 91 657 12 69

CLASIFICACIÓN DEL PRODUCTO DE ACUERDO CON EL RG nº 1272/2008 (CLP)
- P102 Mantener fuera del alcance de los niños. - P201 Pedir instrucciones especiales antes del uso. - P202 No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad. - P270 No comer, beber ni fumar durante su uso. - P501 Eliminar el contenido/el recipiente de acuerdo con las regulaciones nacionales. Indicaciones de peligro suplementarias: Reservado exclusivamente a usuarios profesionales.

INSTRUCIONES DE ALMACENAMIENTO:
Almacenar en un lugar seco en el recipiente original correctamente cerrado. Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores a 40ºC ni inferiores a 0. Evitar que se congele.

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD: Este producto es compatible con la mayoría de los agroquímicos de uso común. Sin embargo, dada la gran variabilidad de formulaciones existentes, es recomendable hacer una mezcla previa a escala. No debe mezclarse con componentes cúpricos, azufres, aceites y con productos de reacción alcalina.

ADVERTENCIA: Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc.). La Compañía garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta.

GESTIÓN DE ENVASES: Entregar los envases vacíos o residuos de envases en los puntos de recepción establecidos por el sistema integrado de gestión SIGFITO.