Labdaco 400

Suspensión concentrada (SC)

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)
FUNGICIDA

COMPOSICIÓN: **Dodina 40% p/v (400 g/l)**

Inscrito en el Registro Oficial de P. y M. F. con el No. **ES-01871**

USO RESERVADO A AGRICULTORES Y APLICADORES PROFESIONALES.
A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE, SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO

CARACTERÍSTICAS

LABDACO 400 es un fungicida foliar con actividad preventiva y curativa y acción penetrante. No es sistémico por naturaleza, pero posee cierta actividad sistémica. Su sustancia activa es la dodina, que pertenece a la familia química de las guanidinas y actúa por disrupción de la membrana celular de los hongos.
Clasificación del modo de acción de la sustancia activa según FRAC:

GRUPO	U12	FUNGICIDA

USOS AUTORIZADOS Y DOSIS

Cultivo	Agente	Dosis (l/ha)	Forma y época de aplicación	Volumen de caldo (L/ha)	PS (días)
Cerezo	Cilindrosporiosis, antracnosis del cerezo, *Blumeriella jaapii* Gnomonia del cerezo, *Apiognomonia erythrostoma*	1,7	Uso menor por jerarquía de cultivos. Preferiblemente, aplicar de forma preventiva. Para tratamientos curativos, usar dentro de las 24 horas desde el comienzo de la infección en caso de temperaturas frías. Aplicar durante BBCH 60-79. Realizar un máximo de 2 aplicaciones por campaña con un intervalo de 7 días.	500-1000	14
Frutales de hueso (melocotonero, nectarino y similar)	Abolladura, lepra del melocotonero, *Taphrina deformans*	2,25	Preferiblemente, aplicar de forma preventiva. Aplicar durante BBCH 01-69 y/o después desde la caída del 50 % de las hojas hasta la caída total de las hojas (otoño). Realizar un máximo de 2 aplicaciones por campaña con un intervalo de 7 días.	500-1000	75

Manzano	Moteado o roña del manzano, *Venturia inaequalis*	1,7	Preferiblemente, aplicar en los dos primeros tratamientos del programa preventivo de fungicidas para control de moteado. Para tratamientos curativos, usar dentro de las 24 horas desde el comienzo de la infección en caso de temperaturas frías. En Golden Delicious puede aparecer russeting si se trata después de estado fenológico de botón rosa, también puede aparecer russeting en manzanas Grimes, Golden y Rhode Island. Si el tiempo es frío (por debajo de 5º C) o en condiciones ligeramente secas, no tratar manzanos durante la floración o inmediatamente después de la caída de los pétalos. No aplicar en manzana de sidra. Aplicar desde BBCH 01 hasta 60 días antes de cosecha. Realizar un máximo de 2 aplicaciones por campaña con un intervalo de 7 días.	200-1000	60
Membrillero	Moteado o roña del peral, *Venturia pyrina*	1,7	Uso menor por jerarquía de cultivos. Preferiblemente, aplicar en los dos primeros tratamientos del programa preventivo de fungicidas para control de moteado. Para tratamientos curativos, usar dentro de las 24 horas desde el comienzo de la infección en caso de temperaturas frías. Aplicar desde BBCH 01 hasta 60 días antes de cosecha. Realizar un máximo de 2 aplicaciones por campaña con un intervalo de 7 días.	200-1000	60
Níspero, níspero del Japón	Moteado o roña del manzano, *Venturia inaequalis*	1,7	Uso menor por jerarquía de cultivos . Preferiblemente, aplicar en los dos primeros tratamientos del programa preventivo de fungicidas para control de moteado. Para tratamientos curativos, usar dentro de las 24 horas desde el comienzo de la infección en caso de temperaturas frías. Aplicar desde BBCH 01 hasta 60 días antes de cosecha. Realizar un máximo de 2 aplicaciones por campaña con un intervalo de 7 días	200-1000	60
Olivo	Aceituna jabonosa, antracnosis, *Glomerella cingulata* Repilo del olivo, *Venturia oleaginea*	1,7-2,25	Preferiblemente, aplicar de forma preventiva. Aplicar durante BBCH 11-69. Realizar un máximo de 2 aplicaciones por campaña con un intervalo de 7 días.	1000	7
Peral	Moteado o roña del peral, *Venturia pyrina*	1,7	Preferiblemente, aplicar en los dos primeros tratamientos del programa preventivo de fungicidas para control de moteado. Para tratamientos curativos, usar dentro de las 24 horas desde el comienzo de la infección en caso de temperaturas frías. No aplicar en peral variedad Conference. Si el tiempo es frío (por debajo de 5º C) o en condiciones ligeramente secas, no tratar perales durante la floración o inmediatamente después de la caída de los pétalos. Aplicar desde BBCH 01 hasta 60 días antes de cosecha. Realizar un máximo de 2 aplicaciones por campaña con un intervalo de 7 días.	200-1000	60

MODO DE EMPLEO

Aplicar al aire libre por pulverización foliar con tractor y manual (lanza/pistola o mochila). La primera aplicación puede dosificarse al 0,16-0,20% para acción curativa dentro de las 48 horas desde el comienzo de la infección.

CLASIFICACIÓN

PELIGRO



H315: Provoca irritación cutánea.
H318: Provoca lesiones oculares graves.
H331: Tóxico en caso de inhalación.
H410: Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.

OBSERVACIONES

El preparado no se usará en combinación con otros productos.

ADVERTENCIAS

Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización, pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc.). La compañía garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta.

PARA TODA INFORMACIÓN SOBRE EL USO DE ESTE PRODUCTO Y EN ESPECIAL TODO LO RELATIVO A RIESGOS Y SEGURIDAD, LÉASE DETENIDAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO O PÓNGASE EN CONTACTO CON EL SUMINISTRADOR.

Caf KARYON, SL - www.karyon.es - ® Marca y Logo Registrados de Caf KARYON, SL
Oficina Comercial C/ Chile, 10. 28290 LAS ROZAS, Madrid 91 594 69 70 comercial@karyon.es
Administración 957 651 400 karyon@karyon.es - Registros y Asuntos Regulatorios 626 861 973 registros@karyon.es