BIO-ESTIMULANTE

LAMINACTIF

A base de BIOESTIMULANTE LAMINAVEG®

ABONONOS INORGÁNICOS A BASE DE MACRONUTRIENTES Y ABONOS INORGÁNICOS SIMPLES A BSE DE MICRONUTRIENTS CON BIOESTIMULANTE DE PLANTAS NO MICROBIANO
ABONO LÍQUIDO EN SOLUCIÓN NPK 6-5-5 /6-2.2-4.2

CONTENIDO:
6% NITRÓGENO (N) TOTAL (1.4% de nitrógeno nítrico, 2% nitrógeno amoniacal Y 2.6% de nitrógeno ureico)
5% PENTÓXIDO DE FÓSFORO TOTAL (P_2O_5): (=2.2% P)
(5% pentóxido de fósforo (P_2O_5) soluble en agua (=2.2% P))
OXIDO DE POTASIO (K_2O) (=4.2% K) soluble en agua.
Ingredientes: Nitrato de potasio, ortofosfáto de hidrógeno y diamonio, Urea, concentrado acuoso de laminaria, harina micronizada de laminaria.

Los micronutrientes son completamente solubles en agua: 0.04% de boro (B), en forma boroetanolamina; 0.01% cobre (Cu) quelatado por EDTA; 0.04% hierro (Fe) quelatado por EDTA; 0.04% manganeso (Mn) quelatado por EDTA; 0.01% Zinc (Zn) quelatado por EDTA. 400 g/kg de bioestimulante.

MODO DE EMPLEO

Utilizar en pulverización foliar en un volumen de agua que asegure una buena cobertura foliar. Mejora los criterios de calidad.

USOS AUTORIZADOS Y DOSIS

Cultivos perennes

Árboles frutales: De 1 a 3 aplicaciones a dosis de 3-5 L/ha, en los estados de yema rosada o blanca o flor abierta, inicio de floración o caída de pétalos, inicios de cuajado o cuajado.

Caf KARYON, SL - www.karyon.es - ® Marca y Logo Registrados de Caf KARYON, SL
Oficina Comercial C/ Chile, 10. 28290 LAS ROZAS, Madrid 91 594 69 70 comercial@karyon.es
Administración 957 651 400 karyon@karyon.es - Registros y Asuntos Regulatorios 626 861 973 registros@karyon.es

Vid: Antes de la floración: 3-4 aplicaciones a dosis de 3-5 L/ha desde el estado de hoja (D), hasta el estado de botón floral (H).
Después de la floración: 1-3 aplicaciones a dosis de 3-5 L/ha desde la etapa de floración (I), hasta la etapa de cierre de racimo (K).

Cultivos de hortalizas
De 1-3 aplicaciones a dosis de 3-5 L/ha cada 15 días, desde el estado de 2 a 3 hojas verdaderas.

Cultivos extensivos
Cereales: 1 aplicación a dosis de 3 a 4 L/ha en el estadio 2 nudos y/o espigado.
Maíz: 1 aplicación a dosis de 3 a 4 L/ha desde el estado de 3 a 4 hojas.
Colza: 1 aplicación a dosis de 3 a 4 L/ha desde la etapa de brotación con yemas separadas.
Patatas: 3 aplicaciones a dosis de 3 a 4 L/ha cada 10 días desde la etapa 100% levantada.

Otros cultivos: consultar.

SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

Producto no clasificado.

ALMACENAMIENTO

Conservar en su envase original, debidamente cerrado. Conservar a una temperatura entre 5ºC y 35ºC, protegido de la luz. El producto puede formar cristales a bajas temperaturas.

PRECAUCIONES

Agitar bien el producto antes de usarlo. Se puede mezclar con muchas especialidades fitosanitarias.
Verter LAMINACAL por último en el tanque. Evitar las horas calurosas del día, tratar preferentemente por la mañana o por la noche. La aplicación se realizará bajo la entera responsabilidad del usuario. Utilizar solo en caso de necesidad reconocida. No exceder las dosis apropiadas.
En caso necesario, póngase en contacto con su proveedor habitual para obtener recomendaciones más específicas.

PARA TODA INFORMACIÓN SOBRE EL USO DE ESTE PRODUCTO Y EN ESPECIAL TODO LO RELATIVO A RIESGOS Y SEGURIDAD, LÉASE DETENIDAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO O PÓNGASE EN CONTACTO CON EL SUMINISTRADOR.