HERBICIDA

Quiren 50

Concentrado emulsionable (EC)

CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

HERBICIDA SELECTIVO, SISTÉMICO PARA EL CONTROL DE MALAS HIERBAS ANUALES Y VIVACES EN POST-EMERGENCIA PRECOZ

COMPOSICIÓN: **Quizalofop-p-etil 5% p/v (50 g/l) (5.26% p/p)**

Inscrito en el Registro Oficial de Productos Fitosanitarios con el No. **24.515**

USO RESERVADO A AGRICULTORES Y APLICADORES PROFESIONALES

A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE, SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO

CARACTERÍSTICAS

QUIREN 50 es un herbicida selectivo, sistémico, a base de Quizalofop-p-etil, recomendado para el control de malas hierbas anuales y vivaces en post-emergencia precoz. Se caracteriza por ser absorbido por las hojas y translocado por toda la planta, con movimiento en el xilema y floema y acumulación en los tejidos meristemáticos.
Quizalofop es una sustancia activa del grupo de los ariloxifenoxipropionatos que actúa como inhibidor de la acetil CoA carboxilasa e impide la biosíntesis de los ácidos grasos.

Clasificación del modo de acción de la sustancia activa según HRAC:

GRUPO 1 HERBICIDA

APLICACIONES AUTORIZADAS

Cultivo	Malas hierbas controladas	Dosis (l/ha)	PS (días)	Forma y época de aplicación
Ajo y cebolla	Gramíneas anuales	1-2	55	Aplicar desde el desarrollo de la segunda hoja (BBCH12) hasta final del crecimiento longitudinal (BBCH39). En post-emergencia de las malas hierbas.
	Gramíneas plurianuales	1-3		
Colza, lino, soja y algodonero	Gramíneas anuales	1-2	90	
	Gramíneas plurianuales	1-3		
Garbanzo, lentejas, judía verde, judía para grano, guisante verdes, guisante para grano, haba para grano, haba verde	Gramíneas anuales	1-2	54	
	Gramíneas plurianuales	1-3		
Girasol	Gramíneas anuales	1-2	45	
	Gramíneas plurianuales	1-3		

Caf KARYON, SL - www.karyon.es - ® Marca y Logo Registrados de Caf KARYON, SL
Oficina Comercial C/ Chile, 10. 28290 LAS ROZAS, Madrid 91 594 69 70 comercial@karyon.es
Administración 957 651 400 karyon@karyon.es - Registros y Asuntos Regulatorios 626 861 973 registros@karyon.es

Patata	Gramíneas anuales	1-2	56	
	Gramíneas plurianuales	1-3		
Remolacha azucarera	Gramíneas anuales	1-2	60	
	Gramíneas plurianuales	1-3		
Tabaco, alfalfa, trébol y veza	Gramíneas anuales	1-2	21	
	Gramíneas plurianuales	1-3		
Berenjena y Tomate	Gramíneas anuales	1-2	56	Sólo al aire libre. Aplicar desde el desarrollo de la segunda hoja (BBCH12) hasta final del crecimiento longitudinal (BBCH39). En post-emergencia de las malas hierbas
	Gramíneas plurianuales	1-3		
Fresal	Gramíneas anuales	1-2	42	
	Gramíneas plurianuales	1-3		
Arbustos y pequeños árboles ornamentales, Coníferas, Frondosas y Palmáceas (espacios abiertos y viveros) Ornamentales herbáceas (sólo al aire libre), Palmera datilera (espacios abiertos y viveros, exclusivamente para uso ornamental (no apto para consumo humano)).	Gramíneas anuales	1-2	NP	Aplicar desde el desarrollo de la segunda hoja (BBCH 12) hasta final del crecimiento longitudinal (BBCH 39). En post-emergencia de las malas hierbas.
	Gramíneas plurianuales	1-3		
Cítricos	Gramíneas anuales	1-2	35	Aplicar desde las primeras hojas visibles (BBCH12) hasta fin de la floración (BBCH69). En post-emergencia de las malas hierbas
	Gramíneas plurianuales	1-3		
Frutales de cáscara (exclusivamente almendro, avellano, nogal, pistachero, castaño y pacana o nuez de pecán) **Frutales de hueso** (endrino únicamente para tratamientos a plantaciones comerciales), melocotonero, albaricoquero, ciruelo y cerezo) **Frutales de pepita** (exclusivamente manzano, peral, níspero, níspero del Japón y membrillero)	Gramíneas anuales	1-2	35	Aplicar desde primeras hojas desplegadas (BBCH12) hasta estadío de balón del órgano floral (BBCH59). En post-emergencia de las malas hierbas
	Gramíneas plurianuales	1-3		

Vid	Gramíneas anuales y plurianuales	1-2	35	Aplicar desde dos hojas desplegadas (BBCH12) hasta inflorescencias desarrolladas completamente y flores separándose (BBCH57). En post-emergencia de las malas hierbas

MODO DE EMPLEO

Aplicar al aire libre en pulverización normal con tractor con un volumen de caldo de 300-400 l/ha. Realizar una única aplicación por campaña en post-emergencia del cultivo.

OBSERVACIONES

En la aplicación del producto deben tomarse precauciones para que la deriva de la pulverización no alcance cultivos de cereales colindantes.
Esperar 3 meses antes de sembrar cereales en parcelas tratadas con QUIREN 50.
Alternar productos con diferente modo de acción en caso de que para el control de las malas hierbas se requiera repetir el tratamiento.
El producto no se usará en combinación con otros productos.
Uso reservado a agricultores y aplicadores profesionales (cultivos agrícolas, plantaciones agrícolas, forestales) no destinados al público en general. Producto no autorizado en ámbitos distintos de la producción primaria agraria definidos en el artículo 46 del Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre.

CLASIFICACIÓN

PELIGRO



Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
Provoca lesiones oculares graves.
Puede irritar las vías respiratorias.
Puede provocar somnolencia o vértigo.
Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.

ADVERTENCIA
PARA TODA INFORMACIÓN SOBRE EL USO DE ESTE PRODUCTO Y EN ESPECIAL TODO LO RELATIVO A RIESGOS Y SEGURIDAD, LÉASE DETENIDAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO O PÓNGASE EN CONTACTO CON EL SUMINISTRADOR