HERBICIDA

Teseo

Concentrado emulsionable (EC)

HERBICIDA

COMPOSICIÓN: Pendimetalina 33% p/v (330 g/l)

Contiene nafta disolvente del petróleo, nº CAS 64742-94-5

INSCRITO EN EL REGISTRO OFICIAL DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS
Nº: ES-00063 (Denominación Común)

CLASIFICACIÓN TOXICOLÓGICA: ver etiqueta

USO RESERVADO A AGRICULTORES Y APLICADORES PROFESIONALES.

A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE, SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO.

ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO, LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA.

CARACTERÍSTICAS:

TESEO es un herbicida selectivo a base de pendimetalina para el control de malas hierbas anuales gramíneas y de hoja ancha en pre-emergencia. Su persistencia en el suelo es del orden de 3 meses.

Clasificación del modo de acción de la sustancia activa según HRAC:

GRUPO	3	HERBICIDA

APLICACIONES AUTORIZADAS:

CULTIVO	PLAGA/EFECTO	DOSIS (L/ha)	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN	Vol. Caldo (L/ha)	PS (días)
Algodonero	Monocotiledóneas anuales	4-6	Uso menor por jerarquía de cultivos. Aplicar en pre emergencia del cultivo.	250-800	NP
	Dicotiledóneas anuales				
Garbanzo, guisante para grano, guisante verde, haba para grano	Monocotiledóneas anuales	3,6-6	Uso menor por jerarquía de cultivos. Aplicar cada 2 años en pre emergencia del cultivo.	200-800	NP
	Dicotiledóneas anuales				

Caf KARYON, SL - www.karyon.es - ® Marca y Logo Registrados de Caf KARYON, SL
Oficina Comercial C/ Chile, 10. 28290 LAS ROZAS, Madrid 91 594 69 70 comercial@karyon.es
Administración 957 651 400 karyon@karyon.es - Registros y Asuntos Regulatorios 626 861 973 registros@karyon.es

Girasol	Monocotiledóneas anuales	3,6-6	Aplicar cada 2 años en pre emergencia del cultivo. La dosis máxima en cultivos destinados a forraje será de 3 l/Ha.	200-800	NP
	Dicotiledóneas anuales				
Judía para grano, judía verde	Monocotiledóneas anuales	3,6-4,8	Uso menor por jerarquía de cultivos. Aplicar cada 2 años en pre emergencia del cultivo.	200-800	NP
	Dicotiledóneas anuales				
Lechuga	Monocotiledóneas anuales	3-4,8	Aplicar cada 2 años en preemergencia o pre-trasplante.	200-400	75
	Dicotiledóneas anuales				
Maíz	Monocotiledóneas anuales	3-4,8	Aplicar en pre emergencia del cultivo. la dosis máxima en cultivos destinados a forraje será de 3 l/Ha.	200-800	NP
	Dicotiledóneas anuales				
Patata	Monocotiledóneas anuales	3,6-4,8	Aplicar cada 2 años en pre emergencia del cultivo.	250-800	NP
	Dicotiledóneas anuales				
Pimiento	Monocotiledóneas anuales	4-4,8	Aplicar cada 2 años en pre emergencia o pretrasplante del cultivo.	250-800	NP
	Dicotiledóneas anuales				
Soja	Monocotiledóneas anuales	3-6	Uso menor por jerarquía de cultivos. Aplicar cada 2 años en pre emergencia del cultivo.	250-600	NP
	Dicotiledóneas anuales				
Tabaco	Monocotiledóneas anuales	3,6-4,8	Uso menor por jerarquía de cultivos. Aplicar cada 2 años en pretrasplante del cultivo.	250-800	NP
	Dicotiledóneas anuales				
Zanahoria	Monocotiledóneas anuales	3-4,8	Aplicar cada 2 años en pre emergencia del cultivo.	250-800	NP
	Dicotiledóneas anuales				

PS: Plazo de seguridad NP: No procede fijar plazo de seguridad

MODO DE EMPLEO:

Controla malas hierbas anuales en preemergencia.

No aplicar este producto ni ningún otro que contenga pendimetalina más de una vez cada dos años (excepto en algodonero), en pulverización a baja presión dirigida al suelo, manualmente o mediante tractor equipado de cabina cerrada y barra hidráulica, con el suelo bien preparado y limpio de malas hierbas, en una única aplicación por campaña.

Se debe considerar un plazo de espera (PHI) de 90 días para los cultivos de rotación subsiguientes.

Caf KARYON, SL - www.karyon.es - ® Marca y Logo Registrados de Caf KARYON, SL
Oficina Comercial C/ Chile, 10. 28290 LAS ROZAS, Madrid 91 594 69 70 comercial@karyon.es
Administración 957 651 400 karyon@karyon.es - Registros y Asuntos Regulatorios 626 861 973 registros@karyon.es

Entre las especies de malas hierbas sensibles se encuentran:

Gramíneas: *Alopecurus myosuroides, Digitaria sanguinalis, Echinochloa crus-galli, Setaria spp., Panicum dichotomiflorum.*

Anuales de hoja ancha: *Amarathus spp., Atriplex spp., Heliotropium europaeum, Capsella bursa pastoris, Chenopodium album, Euphorbia spp., Fumaria spp., Myosotis arvensis, Mercurialis annua, Papaver rhoeas, Portulaca oleracea, Polygonum spp., Solanum nigrum, Thlaspi arvenses, Urtica urens, Veronica spp.*

OBSERVACIONES:

El preparado no se usará en combinación con otros productos.

RESISTENCIAS:

Para evitar la aparición de resistencias siga las recomendaciones de la etiqueta y vigile regularmente los campos para detectar cualquier síntoma de bajo control. Utilice herbicidas con diferente modo de acción.

PARA TODA INFORMACIÓN SOBRE EL USO DE ESTE PRODUCTO Y EN ESPECIAL TODO LO RELATIVO A RIESGOS Y SEGURIDAD, LÉASE DETENIDAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO O PÓNGASE EN CONTACTO CON EL SUMINISTRADOR.

Caf KARYON, SL - www.karyon.es - ® Marca y Logo Registrados de Caf KARYON, SL
Oficina Comercial C/ Chile, 10. 28290 LAS ROZAS, Madrid 91 594 69 70 comercial@karyon.es
Administración 957 651 400 karyon@karyon.es - Registros y Asuntos Regulatorios 626 861 973 registros@karyon.es